

ABSTRAK

Pasien yang terdiagnosis skizofrenia berjumlah 1.409 orang, lebih banyak dibandingkan jumlah pasien rawat inap dengan diagnosis lain di RSJ Provinsi Jawa Barat. Lebih dari 90% pasien skizofrenia mengalami halusinasi. Halusinasi pada penderita skizofrenia dapat menimbulkan dampak negatif. Penderita halusinasi pendengaran dapat merugikan dirinya sendiri atau bahkan orang di sekitarnya. Salah satu jenis halusinasi tersebut adalah halusinasi pendengaran. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pasien skizofrenia, peneliti ingin mengetahui sejauh mana halusinasi pendengaran yang terjadi pada pasien skizofrenia di RSJ Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tingkat halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia yang dirawat di RSJ Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dipadukan dengan penelitian deskriptif. Hasil observasi di RSJ menunjukkan 77 responden menderita skizofrenia. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel data yang diperoleh sebanyak 65 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner AHRS (*Auditory Hallucinations Rating Scale*) dengan analisis distribusi frekuensi univariat. Hasil penelitian menunjukkan 35 orang (53,8%) berada pada tingkat sedang, 14 orang (21,5%) berada pada tingkat ringan, dan 12 orang (18,5%) berada pada tingkat berat. Kesimpulannya tingkat halusinasi pendengaran pasien rata-rata. Dari hasil tersebut diharapkan RSJ Provinsi Jawa Barat dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menurunkan tingkat halusinasi pendengaran, salah satunya dengan menghardik, serta memberikan informasi kepada responden yang terkena dampak. Serta manfaat dan menghardik dapat menurunkan halusinasi pendengaran.

Kata kunci : tingkat halusinasi pendengaran, Skizofrenia

Keperpustakaan : 8 buku 2014

40 jurnal 2014-2022

ABSTRACT

There were 1,409 patients diagnosed with schizophrenia, more than the number of inpatients with other diagnoses at RSJ West Java Province. More than 90% of schizophrenia patients experience hallucinations. Hallucinations in schizophrenia sufferers can have a negative impact. Sufferers of auditory hallucinations can harm themselves or even those around them. One type of hallucination is auditory hallucination. Based on the phenomena that occur in schizophrenic patients, researchers want to know the extent of auditory hallucinations that occur in schizophrenic patients at RSJ West Java Province. This research was conducted with the aim of determining the level of auditory hallucinations in schizophrenic patients treated at RSJ West Java. The research method used is a quantitative method combined with descriptive research. The results of observations at RSJ showed that 77 respondents suffered from schizophrenia. Data was collected using a purposive sampling method and the data sample obtained was 65 respondents. The instrument used was the AHRS (Auditory Hallucinations Rating Scale) questionnaire with univariate frequency distribution analysis. The results showed that 35 people (53.8%) were at the moderate level, 14 people (21.5%) were at the mild level, and 12 people (18.5%) were at the severe level. In conclusion, the patient's level of auditory hallucinations was average. From these results, it is hoped that the West Java Province RSJ can take strategic steps to reduce the level of auditory hallucinations, one of which is by warning and providing information to affected respondents. As well as the benefits and rebuke can reduce auditory hallucinations.

Keywords: level of auditory hallucinations, schizophrenia

Libraries: 8 books 2014

40 journals 2014-2022