

ABSTRAK

Latar belakang: *Chronic Kidney Disease* (CKD) terjadi akibat kerusakan ginjal secara struktural atau fungsional yang berlangsung dalam waktu lebih dari 3 bulan, atau penurunan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) kurang dari 60 mL/min/1.73 m² dalam waktu 3 bulan atau lebih dengan atau tanpa kerusakan struktur ginjal sehingga tubuh gagal mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan elektrolit, yang menyebabkan uremia. **Metode:** karya tulis ilmiah ini menggunakan asuhan keperawatan deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus untuk yaitu untuk mengeksplorasi suatu masalah atau fenomena yang memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Studi Kasus ini dilakukan pada dua orang pasien *Chronic Kidney Disease* dengan masalah kecemasan atau ansietas. **Hasil:** setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan memberikan intervensi keperawatan dengan masalah keperawatan ansietas pada pasien 1 dan pasien 2 yaitu didapatkan hasil bahwa ansietas pasien menurun. **Dikusi:** Pasien dengan masalah keperawatan ansietas perlu dilakukan tindakan secara konsisten dalam mengatasi kecemasannya status, sehingga peran perawat harus melakukan asuhan yang komprehensif untuk menangani masalah keperawatan pada setiap pasien.

Katakunci: *Chronic Kidney Disease*, ansietas, asuhan keperawatan.

ABSTRACT

Background: *Chronic Kidney Disease* (CKD) occurs due to structural or functional kidney damage that lasts for more than 3 months, or a decrease in the Glomerular Filtration Rate (GFR) of less than 60 mL/min/1.73 m² for 3 months or more with or without damage to the structure of the kidney so that the body fails to maintain metabolism and fluid-electrolyte balance, which causes uremia. **Method:** this scientific paper uses descriptive qualitative nursing care in the form of a case study to explore a problem or phenomenon that has in-depth data collection and includes various sources of information. This case study was conducted on two *Chronic Kidney Disease* patients with anxiety problems. **Results:** after nursing care was carried out by providing nursing interventions with anxiety nursing problems in patient 1 and patient 2, the result was that the patient's anxiety decreased. **Discussion:** Patients with anxiety nursing problems need to take action consistently in overcoming their anxiety status, so the nurse's role must be to carry out comprehensive care to deal with nursing problems for each patient.

Keywords: *Chronic Kidney Disease*, anxiety, nursing care.