

ABSTRAK

Masa nifas dimulai dari 2 jam sampai 6 minggu setelah kelahiran plasenta. Penyebab terjadinya kematian ibu nifas yaitu pendarahan diakibatkan oleh robekan perineum. faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka perineum yaitu Faktor usia, pendidikan, Gizi , Anemia, Mobilisasi , Vulva hygiene, dan Pengetahuan.

Jenis penelitian Deskriptif dengan melakukan pengisian kuesioner, menggunakan Analisa Univariat. Lokasi penelitian di Wilayah kerja BPM Nita Sintariani dari februari hingga juni . populasi penelitian seluruh ibu nifas yang mengalami luka perineum

Hasil dalam penelitian didapatkan bahwa dari 30 responden ibu nifas yang mengalami luka pada perineum di wilayah kerja BPM Nita sintariani 18 orang memiliki usia yang baik, 23 orang memiliki pendidikan yang tinggi, 16 orang memiliki pengetahuan yang baik , 20 orang status gizi normal , 20 orang memiliki haemoglobin normal , 19 orang memiliki Mobilisasi baik, dan 16 orang memiliki vulva hygiene yang baik .

Simpulan dari penelitian ini sebagian besar faktor penyembuhan luka perineum di wilayah kerja BPM Nita sintariani memiliki nilai-nilai faktor yang baik.

Kata kunci : Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka perineum, luka perineum, Nifas

Kepustakaan : 8 Buku (2017-2022), 28 jurnal (2016-2022), 1 website (2020)

ABSTRACTs

The postpartum period starts from 2 hours to 6 weeks after the delivery of the placenta. The cause of postpartum maternal death is bleeding caused by perineal tears. Factors influencing perineal wound healing are age, education, nutrition, anemia, mobilization, vulvar hygiene, and knowledge.

This type of research is descriptive by filling out a questionnaire, using univariate analysis. The research location is in the working area of BPM Nita Sintariani from February to June. The study population was all postpartum mothers who had perineal injuries.

The results in the study found that of the 30 postpartum mothers who suffered injuries to the perineum in the working area of BPM Nita sintariani 18 people had a good age, 23 people had a high education, 16 people had good knowledge, 20 people had normal nutritional status, 20 people have normal hemoglobin, 19 people have good mobilization, and 16 people have good vulvar hygiene.

The conclusion of this study is that most of the factors of perineal wound healing in the work area of BPM Nita sintariani have good factor values.

Key words : *Factors influencing perineal wound healing, perineal wound, postpartum*

Library of : *8 books (2016-2022), 28 journals (2017-2022), 1 website (2022)*