

ABSTRAK

POLA PENGGUNAAN OBAT CEFIXIME SYRUP PADA PASIEN ISPA ANAK-ANAK RAWAT INAP di SALAH SATU RSUD di KOTA BANDUNG

**AYU DESWITA RAHMALIA
211FF01028**

Infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA) adalah penyakit saluran pernafasan atas atau bawah yang biasanya menular dan dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisar dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan.. ISPA dapat terjadi pada beberapa organ seperti sinus, faring, laring, hingga hidung. ISPA banyak terjadi pada anak-anak hingga lansia namun di salah satu RSUD di Kota Bandung, ISPA banyak terjadi pada anak-anak maka penelitian jenis kelamin dan usia akan menjadi perbandingan yang relevan begitu pula dengan perbandingan obat yang digunakan untuk penyembuhan ISPA pada anak-anak ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling dan jumlah sampel yang diambil yaitu 50 resep pasien anak-anak usia 1-12 tahun dengan diagnosa ISPA dengan pengobatan cefixime syrup dan cefadroxil syrup. Jumlah perbandingan pengobatan obat cefixime syrup lebih banyak yaitu 32 pasien sedangkan cefadroxil syrup berjumlah 18 pasien. Untuk perbandingan berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki lebih banyak dengan jumlah 28 pasien dan anak perempuan berjumlah 22 pasien. Namun berdasarkan usia, kasus ispa banyak terjadi pada anak usia 4-7 tahun dan anak usia 9&12 tahun.

Kata Kunci : ISPA, Cefixime syrup, Cefadroxil syrup, Pengobatan ISPA.

ABSTRACT

PATTERNS OF USE OF CEFIXIME SYRUP IN INPATIENT CHILDREN ISPA PATIENTS IN ONE OF THE HOSPITAL IN BANDUNG CITY

AYU DESWITA RAHMALIA
211FF01028

Acute Respiratory Tract Infection (ARI) is a disease of the upper or lower respiratory tract which is usually contagious and can cause a wide spectrum of diseases ranging from asymptomatic disease or mild infections to severe and deadly diseases. ARI can occur in several organs such as the sinuses, pharynx, larynx, up to the nose. ISPA often occurs in children and the elderly, but in one of the regional hospitals in Bandung City, ISPA often occurs in children, so research on gender and age will be a relevant comparison as well as the comparison of drugs used to cure ISPA in children. This. The research method used was descriptive quantitative with sampling carried out by Purposive Sampling and the number of samples taken was 50 prescriptions from children aged 1-12 years with a diagnosis of ARI with treatment with cefixime syrup and cefadroxil syrup. The comparison number of cefixime syrup drug treatments was greater, namely 32 patients, while cefadroxil syrup was 18 patients. For comparison based on gender, there were more boys with 28 patients and girls with 22 patients. However, based on age, ISPA cases mostly occur in children aged 4-7 years and children aged 9 & 12 years.

Keywords: ARI, Cefixime syrup, Cefadroxil syrup, Medication of ARI