

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Skala nyeri pada pasien pasca bedah saraf yang sudah diberikan analgetik tramadol dan ketorolak setelah 30 menit seluruhnya (100%) berada pada skala nyeri ringan.
2. Skala nyeri pada pasien pasca bedah saraf yang telah diberikan analgetik tramadol dan ketorolak meningkat setelah 6 jam seluruhnya (100%) menjadi nyeri sedang.
3. Skala nyeri pada pasien pasca bedah abdomen yang sudah diberikan analgetik tramadol dan ketorolak setelah 30 menit separuh setengahnya (66,6%) mengalami nyeri ringan.
4. Skala nyeri pada pasien pasca bedah abdomen yang sudah diberikan analgetik tramadol dan ketorolak setelah 6 jam hampir dari setengahnya (57,5%) mengalami nyeri ringan

5.2 Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Bagi rumah sakit diharapkan agar penelitian ini menjadi acuan dasar untuk menganalisa mutu pelayanan penata anestesi khususnya pada pelaksanaan tindakan pengurangan rasa nyeri pasca operasi.

2. Peneliti Lain

Berdasarkan keterbatasan peneliti, diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat mengidentifikasi jumlah sampel atau responden dengan jumlah yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama.