

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase jumlah pemakaian obat diare pada pasien diare di depo IGD RSUD Sayang Cianjur Laki-laki 57% Perempuan 43% penderita diare paling banyak diusia masa balita 0-5 tahun dengan persentase 33% dan usia 12-16 tahun dengan persentase 24%.
2. Berdasarkan jumlah pemakaian obat diare di bulan November 2023 paling banyak menggunakan obat L-bio dengan jumlah 45 kasus (45%), zink tablet 35 kasus (35%), zink sirup 38 kasus (38%), cefixime sirup 34 kasus (34%) cefixime 100 mg 15 kasus (15%), Oralit 23 kasus (23%) attapulgit 23 kasus (23%) dan loperamide 21 kasus (21%). Dan lama dosis dan pemberian obat diare cukup tepat, seperti L-bio diberikan pada anak 3 sachet dalam sehari, dan dosis obat yang lain sesuai dengan tabel diatas.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jumlah pemakaian obat diare pada pasien pulang di depo farmasi IGD RSUD Sayang Cianjur, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi petugas kesehatan dengan meningkatkan program-program yang bertujuan menurunkan kejadian diare melalui penyuluhan kepada masyarakat luas.
2. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah variabel maupun sampel dan kesesuaian pola persebaran berdasarkan panduan atau literatur yang ada.