

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Sebagian besar ibu bersalin yang mengalami preeklamsia dan hampir setengahnya tidak mengalami preeklamsia.
2. Sebagian besar usia ibu bersalin yang mengalami preeklamsia berada pada usia tidak berisiko 20-35 tahun dan hampir setengahnya pada usia berisiko.
3. Sebagian besar ibu bersalin yang mengalami preeklamsia terjadi pada paritas berisiko <20, >35 tahun dan hampir setengahnya pada paritas tidak berisiko
4. Ada hubungan usia dengan kejadian preeklamsia pada ibu bersalin di RSUD dr.Slamet Garut Tahun 2023, didapatkan *Chi square p-value* sebesar 0,000.
5. Ada hubungan paritas dengan kejadian preeklamsia di RSUD dr.Slamet Garut Tahun 2023, didapatkan *Chi square* dengan *p-value* 0,022.

5.2 SARAN

1. Bagi Istitusi

Diharapkan para petugas kesehatan dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanan ANC untuk deteksi dini mencegah risiko terjadinya kasus preeklamsia dengan memberikan edukasi atau intervensi.

2. Bagi Ibu Bersalin

Diharapkan penelitian ini bagi ibu bersalin dapat melaksanakan pemeriksaan ANC secara teratur.