

ABSTRAK

Gambaran Tingkat Nyeri Pada Pasien Pasca Operasi Bedah Digestif di Ruang Rawat Inap RSUD Cibabat

Oleh:

Alya Zahra Aprina
191FI03002

Prevalensi nyeri pada pasien pasca bedah digestif yang tinggi menunjukkan urgensi dalam penanganan manajemen nyeri. Peran penata anestesi dibutuhkan dalam melakukan pengkajian nyeri serta penatalaksanaan nyeri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat nyeri pada pasien pasca operasi bedah digestif di ruang rawat inap RSUD Cibabat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan observasional, melibatkan sampel penelitian 30 pasien pasca bedah digestif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *accidental sampling*, dan instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi dengan indikator VAS (*Visual Analogue Scale*) yang kemudian dianalisis menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengeluhkan nyeri skala berat (7-10) setelah diberikan analgetik tramadol 100 mg dan ketorolac 60 mg drip. Kesimpulan dari penelitian ini adalah gambaran tingkat nyeri pada pasien pasca bedah digestif di RSUD Cibabat 4 jam setelah pasca operasi menunjukkan sebagian besar berada pada skala nyeri berat. Sehingga disarankan pengkajian nyeri lebih ditingkatkan dan penelitian lanjutan tentang manajemen nyeri pasca operasi.

Kata kunci: nyeri pasca operasi, bedah digestif, gambaran, visual analog scale

ABSTRACT

Description of Pain Levels in Post-Digestive Surgery Patients in the Inpatient Room of Cibabat Hospital

by:

Alya Zahra Aprina

191FI03002

The high prevalence of patients experiencing post-digestive surgery pain shows the urgency to be taken care of. The role of nurse anesthetis is needed in carrying out pain assessment and pain management in post-digestive surgery patients. The purpose of this study was to describe the level of pain in post-digestive surgery patients in the inpatient room of Cibabat Hospital. This research used quantitative method with observational approach involving 30 post-digestive surgery patients. Sampling technique in this study used accidental sampling and for research instrument used observation sheet using the VAS (Visual Analogue Scale) indicator which would then be analyzed using descriptive data analysis. The results showed that most of the respondents complained of severe pain (7-10) after being given the analgesic of tramadol 100 mg and ketorolac 60 mg drip. This study conclude that the level of pain in post-digestive surgery patients at Cibabat Hospital 4 hours after post-surgery shows that most of them are on the severe pain scale. So it is recommended that pain assessment be further improved and further research on postoperative pain management.

Keywords: postoperative pain, digestive surgery, description, visual analog scale