

ANALISIS KEPATUHAN PASIEN RAWAT JALAN DALAM PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI DI PUSKESMAS IMOGIRI I

SELI ANDINI

201FF03073

Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi
Universitas Bhakti Kencana

ABSTRAK

Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronik yang sangat berbahaya dan biasanya memerlukan pengobatan jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan karakteristik pasien dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien hipertensi di Puskesmas Imogiri I. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat observasional dengan pendekatan *cross-sectional*. Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret – April 2024 dengan jumlah sampel sebanyak 94 responden. Data yang digunakan yaitu data primer berupa kuesioner kepatuhan *Morisky Medication Adherence Scale-8* (MMAS-8). Analisis data secara univariat dan bivariat menggunakan aplikasi SPSS. Pasien hipertensi di Puskesmas Imogiri I memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dengan rata-rata skor 5. Hasil uji bivariat menggunakan uji *chi-square* didapatkan nilai $p < 0,05$ yang artinya ada hubungan antara tingkat kepatuhan dengan regimen terapi (0,005) dan lama menderita hipertensi (0,005).

Kata kunci: Hipertensi, kepatuhan minum obat, karakteristik pasien

**ANALYSIS OF OUTPATIENT COMPLIANCE IN USING
ANTIHYPERTENSIVE DRUGS AT IMOGIRI I COMMUNITY HEALTH
CENTER**

SELI ANDINI

201FF03073

Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Bhakti Kencana University

ABSTRACT

Hypertension is a chronic disease that is very dangerous and usually requires long-term treatment, this can affect medication compliance in hypertensive patients. The aim of this study was to determine the relationship between patient characteristics and the level of medication compliance for hypertensive patients at the Imogiri I Community Health Center. This research method used an observational type of research with a cross-sectional approach. Data collection was carried out in March – April 2024 with a sample size of 94 respondents. The data used is primary data in the form of the Morisky Medication Adherence Scale-8 (MMAS-8) compliance questionnaire. Univariate and bivariate data analysis using the SPSS application. Hypertensive patients at the Imogiri I Community Health Center had a low level of compliance with an average score of 5. The results of bivariate tests using the chi-square test showed a p value <0.05 , which means there is a relationship between the level of compliance with the therapy regimen (0.005) and the length of time suffering from hypertension. (0.005).

Keywords: Hypertension, medication adherence, patient characterist