

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian berkaitan dengan “Hubungan Kebiasaan Merokok Keluarga dengan Kejadian Tuberkulosis Pada Anak Usia 3 – 6 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Linggar” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proporsi kebiasaan merokok keluarga, sebagian besar anak tinggal dengan keluarga perokok (76,7%) dengan jenis rokok putih (40%), durasi merokok > 19 menit (50%), jumlah rokok <12 batang rokok per hari (63,3%) dan merokok di dalam rumah (53,4%). Sedangkan sebagian besar kontrol bukan perokok (60%).
2. Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok keluarga (keluarga yang merokok, mengonsumsi <12 batang rokok/ hari, jenis rokok putih, durasi merokok > 19 menit, dan merokok dalam rumah) dengan kejadian TB pada anak usia 3 – 6 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Linggar

6.2 Saran

1. Bagi pelayanan kesehatan di Puskesmas Linggar, peneliti menyarankan agar menambahkan pada *leaflet* berkaitan dengan faktor risiko penyebab TB anak.
2. Bagi peneliti selanjutnya apabila akan melakukan penelitian serupa, maka disarankan untuk mempertimbangkan terkait status gizi anak dengan kejadian TB anak.