

ABSTRAK

GAMBARAN KECEMASAN PASIEN BERDASARKAN FAKTOR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK YANG AKAN MENJALANI OPERASI ELEKTIF DENGAN ANESTESI UMUM DI RSUD SUMEDANG

Oleh:

FATHAN AHMAD MUJADID

191FI03030

Kecemasan merupakan suatu hambatan keberlangsungan anestesi umum. Masalah kecemasan ini bisa berdampak negatif bahkan bisa mengakibatkan pembatalan operasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD Sumedang bahwa pasien yang akan menjalani operasi elektif semuanya mengalami kecemasan. Metode pada penelitian ini deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling dengan jumlah 30 responden. Hasil penelitian sebagian besar mengalami kecemasan sedang 19 (63,3%) responden, kecemasan berat 7 (23,3%) responden, dan kecemasan ringan 4 (13,3%) responden. Hasil penelitian berdasarkan faktor kecemasan intrinsik yaitu kecemasan sedang tertinggi pada usia dewasa sebanyak 11 (36,3%) responden, dan kecemasan berat tertinggi pada responden usia geriatri 3 (10,0 %). Hasil kecemasan ekstrinsik yaitu kecemasan berat pada responden pendidikan rendah 4 (13,3%), skor kecemasan sedang pada pendidikan tinggi 13 (43,3%) responden , dan kecemasan ringan pada pendidikan tinggi 4 (13,3%) responden. Penelitian ini hanya ditujukan untuk melihat gambaran tingkat kecemasan berdasarkan instrinsik dan ekstrinsik pada pasien yang akan menjalani operasi elektif dengan anestesi umum maka dari itu peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan perbandingan kecemasan berdasarkan faktor lainnya.

Kata kunci : Kecemasan, Umur, Pendidikan

ABSTRACT

DESCRIPTION OF PATIENT ANXIETY BASED ON INTRINSIC AND EXTRINSIC FACTORS WHO WILL UNDERGO SURGERY ELECTIVE UNDER GENERAL ANESTHESIA AT RSUD SUMEDANG

By:

FATHAN AHMAD MUJADID

191FI03030

Anxiety is an obstacle to the continuity of general anesthesia. This anxiety problem can have a negative impact and can even result in cancellation of the operation. Based on the results of a preliminary study at RSUD Sumedang, all patients who will undergo elective surgery experience anxiety. The method in this research is descriptive quantitative. The sampling technique used Accidental Sampling with a total of 30 respondents. The results of the study mostly experienced moderate anxiety 19 (63.3%) respondents, severe anxiety 7 (23.3%) respondents, and mild anxiety 4 (13.3%) respondents. The results of the study were based on intrinsic anxiety factors, namely moderate anxiety was highest in adults as many as 11 (36.3%) respondents, and severe anxiety was highest in geriatric age 3 respondents (10.0%). The results of extrinsic anxiety are severe anxiety in low education respondents 4 (13.3%), moderate anxiety scores in higher education 13 (43.3%) respondents, and mild anxiety in higher education 4 (13.3%) respondents. This study is only intended to see an overview of the level of anxiety based on intrinsic and extrinsic in patients who will undergo elective surgery with general anesthesia, therefore the researchers suggest that future researchers can make comparisons of anxiety based on other factors.

Keywords : Anxiety, Age, Education