

POTENSI INTERAKSI OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI SALAH SATU RSUD KABUPATEN SUBANG

SITI IIPAFIFAH

201FF03183

ABSTRAK

Hipertensi, atau tekanan darah tinggi kronis, sering disebut dengan “*silent killer*” karena tidak menunjukkan gejala yang jelas. Penderita hipertensi beresiko adanya interaksi obat karena obat yang dikonsumsi bisa diberikan secara tunggal, 2 kombinasi ataupun 3 kombinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil penggunaan obat antihipertensi dan interaksi obat yang terjadi pada pasien rawat jalan di RSUD Kabupaten Subang dengan menggunakan data resep pasien tahun 2023 secara retrospektif. Pasien tidak diteliti secara langsung karena termasuk penelitian non-eksperimental. Hasil penelitian didapatkan kombinasi obat antihipertensi yang paling banyak digunakan adalah kombinasi 2 obat yaitu 65 pasien (51,5%). Sedangkan hasil interaksi berdasarkan tingkat keparahan dikategorikan sebagai minor (43 kasus, 18,6%), diikuti moderat (110 kasus, 47,8%) dan mayor (20 kasus, 8,6%) berdasarkan mekanisme interaksi lebih banyak terjadi pada interaksi farmadinamik.

Kata kunci : hipertensi, interaksi obat.

POTENTIAL ANTIHYPERTENSION DRUG INTERACTIONS IN OUTPATIENTS IN ONE OF THE SUBANG DISTRICT HOSPITAL

SITI HIPAFIFAH

201FF03183

ABSTRACT

Hypertension, or chronic high blood pressure, is often called the “silent killer” because it does not show obvious symptoms. Patients with hypertension are the risk of drug interactions because the drugs consumed can be given in single, 2 combinations or 3 combinations. This study analyzed the use of antihypertensive drugs and their potential drug interactions in outpatients at Subang Regency Hospital using medical record data in 2023 retrospectively. Patients were not studied directly because it include non-experimental research. The results showed that the most widely used combination of antihypertensive drugs was a combination of 2 drugs, namely 65 patients (51,5%). While the result of interactions based on severity were categorized as minor (43 cases, 18,6%), followed by moderate (100 cases, 47,8%) and major (20 cases, 8,6%).

Key words: hypertension, drug interactions.