

ABSTRAK

PENGARUH PEMBERIAN AIR MINUM TERHADAP KEJADIAN PADA PASIEN MUAL MUNTAH *POST OPERASI SECTIO CAESAREA* DENGAN ANESTESI SPINAL DI RSUD KOTA BANDUNG

Oleh:
TRESA PRATIWI
191FI03020

Mual dan muntah merupakan komplikasi anestesi spinal dengan angka kejadian 20-40%. Mual dan muntah post operasi dapat menyebabkan rasa sakit, termasuk dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, ketegangan jahitan, perdarahan, hipertensi vaskular, ruptur esofagus, dan masalah saluran napas. Hal ini akan berdampak pada tertundanya pemulangan pasien yang mengakibatkan peningkatan biaya pengobatan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak yang di berikan air minum dan yang tidak diberikan terhadap pasien mual muntah setelah operasi *sectio caesarea* dengan anestesi spinal. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan merupakan *quasi eksperimental*. metode analisis statistik yang digunakan adalah Uji *Paired T-Test*. Uji *Paired T-Test*. Dari hasil uji statistik dengan *Paired Samples Test* nilai P value yang dihasilkan pada kelompok intervensi sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai P value yang dihasilkan pada kelompok control sebesar $0,712 > 0,05$. Kesimpulan nya bahwa terdapat pengaruh pemberian air minum terhadap pasien mual muntah setelah operasi *sectio caesarea* dengan anestesi spinal sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok intervensi. Dan tidak terdapat pengaruh tidak di beriankan air minum terhadap pasien mual muntah setelah operasi *sectio caesarea* dengan anestesi spinal sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok control. Pemberian air putih dapat diberikan pada pasien yang mengalami mual muntah post operasi *section caesarea* dengan anestesi spinal dengan mempertimbangkan hasil dan kolaborasi penata anestesi dan dokter anestesi.

Kata Kunci: Anestesi Spinal, Mual Muntah, Pemberian Air Minum, *Post Operasi Sectio Caesarea*.

ABSTRACT

THE EFFECT OF DRINKING WATER OF THE INCIDENT IN PATIENTS WITH NAUSEA VOMITING AFTER SECTIO CAESAREA SURGERY WITH SPINAL ANESTHESIA AT BANDUNG CITY HOSPITAL

By:
TRESA PRATIWI
191FI03020

Nausea and vomiting are complications of spinal anesthesia with an incidence rate of 20-40%. Postoperative nausea and vomiting can cause pain, including dehydration, electrolyte imbalance, suture tension, bleeding, vascular hypertension, esophageal rupture, and airway problems. This will have an impact on delaying the discharge of patients resulting in an increase in medical costs. The purpose of this research To determine whether or not there is an effect on drinking water and not given to nausea and vomiting patients after sectio caesarea surgery with spinal anesthesia. This study used quantitative research. The quantitative method used is quasi-experimental. The statistical analysis method used is the Paired T-Test. Paired T-Test. Results: from the results of statistical tests with the Paired Samples Test the P value produced in the intervention group was $0.000 < 0.05$, and the P value produced in the control group was $0.712 > 0.05$. His conclusion where it can be concluded that there is an effect of drinking water administration on nausea and vomiting patients after sectio caesarea surgery with spinal anesthesia before and after intervention in the intervention group. And there was no effect of not giving drinking water on nausea patients vomiting after sectio caesarea section with spinal anesthesia before and after intervention in the control group. Water can be given to patients who experience nausea and vomiting after caesarea section surgery with spinal anesthesia by considering the results and collaboration of the anesthetist and dr anesthetist.

Keywords: Drinking Water Administration, Nausea Vomiting, Post Sectio Caesarea Surgery, Spinal Anesthesia