

ABSTRAK

Analisis Asuhan Keperawatan Penerapan *Range Of Motion* (ROM) Pada Tn. S Pasien Stroke Non Hemoragik Dengan Gangguan Mobilitas Fisik Di Ruang Rawat Inap Umar Bin Khatab 3 RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat

Sandra Pebriani¹, Sri Wulan Megawati²

¹ Mahasiswa Profesi Ners, Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana Bandung

² Dosen, Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana Bandung

Latar belakang : Menurut WHO stroke menjadi penyebab kedua kematian tertinggi di dunia. Dampak paling umum dan banyak dialami oleh pasien stroke yaitu terjadinya kelumpuhan ekstremitasi yang menyebabkan gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik jika tidak segera ditangani akan berdampak lebih buruk pada pasien oleh karena itu perlunya penatalaksanaan diberikan kepada pasien salah satunya yang dapat diberikan yaitu ROM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana intervensi ROM pada Tn.S yang mengalami gangguan mobilitas fisik.

Metode : penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu pemberian intervensi ROM di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat.

Hasil : sebelum diberikan intervensi kekuatan otot $\frac{3}{5}$, setelah diberikan intervensi kondisi klien mengalami adanya peningkatan kekuatan otot pasien yaitu kekuatan otot 4/4, pasien sedikit mampu melakukan ROM.

Simpulan intervensi ROM memberikan pengaruh terhadap gangguan mobilitas yaitu adanya peningkatan kekuatan otot pada pasien.

Kata kunci : Mobilitas Fisik, ROM, Stroke

Daftar Pustaka : 7 Buku (2016-2020)

17 Jurnal (2017-2023)

ABSTRACT

Analysis of Nursing Care Application of Range Of Motion (ROM) in Mr. S Non-Hemorrhagic Stroke Patients with Physical Mobility Disorders in the Inpatient Room of Umar Bin Khatab 3 Al-Ihsan Hospital, West Java Province

Sandra Pebriani¹, Sri Wulan Megawati²

¹ Nursing Profession Student, Faculty of Nursing, Bhakti Kencana University, Bandung

² Lecturers, Faculty of Nursing, Bhakti Kencana University, Bandung

Introduction : According to WHO, stroke is the second highest cause of death in the world. The most common and widely experienced impact by stroke patients is the occurrence of extrematory paralysis that causes impaired physical mobility. Physical mobility disorders if not treated immediately will have a worse impact on patients, therefore the need for management is given to patients, one of which can be given, namely ROM. The purpose from this study was to analyze how ROM intervention in Mr.S who experienced impaired physical mobility.

Method: The research used was a case study, namely the provision of ROM intervention at Al-Ihsan Hospital, West Java Province

Results: fore giving muscle strength interventions $\frac{3}{5}$ to $\frac{5}{5}$, after the intervention the client's condition experienced an increase in the patient's muscle strength, namely muscle strength 4/4, the patient was slightly able to do ROM.

Discussion: ROM has an influence on mobility disorders, namely an increase in muscle strength in patients.

Keywords : Physical Mobility, ROM, Stroke

Bibliography: 7 Books (2016-2020)

17 Journals (2016-2023)