

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Cibabat Kota Cimahi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kejadian hipotensi intraoperatif pada pasien seksio sesarea dengan spinal anestesi dialami oleh sebagian besar 23 (60.5%) responden di RSUD Cibabat.
2. Kejadian PONV pasca spinal anestesi pada pasien seksio sesareadi RSUD Cibabat sebagian besar 20 (52.4%) responden.
3. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya hubungan antara hipotensi intraoperatif dengan kejadian PONV pada pasien seksio sesarea dengan spinal anestesi di RSUD Cibabat dengan nilai P value = 0.000 tersebut < 0.05 artinya H_a diterima.

6.2 Saran

1. Sebelum dilakukannya spinal anestesi, untuk menghindari terjadinya hipotensi intraoperatif berikan terapi cairan terlebih dahulu seperti loading ataupun coloadng cairan.
2. Obat premedikasi anti emetic sebaiknya diberikan terlebih dahulu untuk mencegah kejadian PONV pasca operasi.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti lebih lanjut tentang PONV dan faktor lain yang dapat mempengaruhi PONV dengan menggunakan alat ukur yang berbeda ataupun desain penelitiannya.