

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pengaruh pelayanan informasi obat terhadap tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan sirup paracetamol dapat disimpulkan:

1. Tingkat pengetahuan informasi obat sebelum PIO menunjukkan kategori pengetahuan rendah 20% , kategori pengetahuan sedang 40% , kategori pengetahuan tinggi 40% sedangkan untuk perilaku penggunaan sirup paracetamol kategori kurang baik 12%, kategori baik 64% dan kategori sangat baik 24%.
2. Tingkat pengetahuan informasi obat sesudah PIO menunjukkan kategori pengetahuan rendah 8% , kategori pengetahuan sedang 36%, kategori pengetahuan tinggi 56% sedangkan untuk perilaku penggunaan sirup paracetamol kategori kurang baik 2% , kategori baik 54% dan kategori sangat baik 44%.
3. Pengaruh tingkat pelayanan informasi obat terhadap tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan sirup paracetamol sebelum dan sesudah PIO sirup paracetamol pada orang tua / wali menunjukkan hasil uji Parired T dengan nilai 0.003 yang artinya ada pengaruh PIO terhadap perilaku dan 0.0037 yang artinya ada pengaruh PIO terhadap pengetahuan.

6.2 Saran

1. Tenaga kefarmasian di klinik memberikan PIO dengan baik mengenai penggunaan sirup paracetamol dengan memberikan pelayanan kembali kepada orangtua/wali apakah sudah paham terkait penggunaan sirup paracetamol.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian dengan permasalahan yang sama serta menambah variabel lain yang berhubungan dengan pelayanan informasi obat sirup paracetamol.