### **BAB VI**

### SIMPULAN DAN SARAN

### **6.1 SIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan pada 54 pasien yang menjalani terapi hemodialisis di RSUD Al-Ihsan Bandung, dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Sebagian besar pasien yang menjalani terapi Hemodialisis di RSUD Al-Ihsan Bandung mengalami gejala depresi sedang.
- Sebagian besar pasien yang menjalani terapi Hemodialisis di RSUD Al-Ihsan Bandung mengalami kualitas tidur buruk.
- Terdapat hubungan antara gejala depresi dengan kualitas tidur pada pasien yang menjalani terapi Hemodialisis di RSUD Al-Ihsan Bandung

### 6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hubungan gejala depresi dengan kualitas tidur pada pasien yang menjalani terapi Hemodialisis di RSUD Al-Ihsan Bandung, peneliti memberikan saran sehingga dilaksanakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki hubungan gejala depresi dengan kualitas tidur pada pasien yang menjalani terapi Hemodialisis di RSUD Al-Ihsan Bandung.

# 1. Bagi Tempat Penelitian di Rumah Sakit

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan program edukasi/motivasi terhadap pasien maupun keluarga terkait kejadian gejala depresi dan kualitas tidur pada pasien yang menjalani terapi hemodialisis

# 2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dan bahan pembelajaran keperawatan tentang hubungan gejala depresi dengan kualitas tidur pada penyakit gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis.

# 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan kajian pustaka dalam meneliti terkait gejala depresi dan kualitas tidurpada pasien yang menjalani terapi hemodialisis dengan meneliti faktor-faktor lain yang berhubunggan dengan depresi dan kualitas tidur seperti kecemasan.