

ABSTRAK

GAMBARAN POLA PENGGUNAAN OBAT ANTIPSIKOTIK PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI SALAH SATU RUMAH SAKIT JIWA DI BANDUNG

Oleh :

Fitri Rahmadona

191FF03113

Skizofrenia merupakan penyakit gangguan jiwa yang paling kompleks dan menantang. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia ialah masalah kesehatan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian yang serius dan upaya penatalaksanaan untuk skizofrenia dengan menggunakan pengobatan antipsikotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola penggunaan obat antipsikotik pada pasien skizofrenia di salah satu rumah sakit jiwa di Bandung. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif retrospektif dengan menggunakan data rekam medis pasien periode Januari-Maret 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 100 pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pasien berjenis kelamin laki-laki yang paling banyak menderita skizofrenia yaitu 72 pasien (72%) dengan rentang usia 36-45 tahun sebanyak 36 pasien (36%). Obat Antipsikotik Kombinasi yang paling banyak digunakan adalah Haloperidol + Trihexyphenidil + Clozapin dengan persentase sebesar 17,72% sedangkan Obat Antipsikotik tunggal yang paling banyak digunakan adalah Risperidone dengan persentase sebesar 47,62 %.

Kata Kunci : Skizofrenia, Antipsikotik , Pola Penggunaan, Rumah Sakit Jiwa

ABSTRACT

DESCRIPTION OF THE PATTERN OF USE OF ANTIPSYCHOTIC DRUGS IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS AT A MENTAL HOSPITAL IN BANDUNG

By :

Fitri Rahmadona

191FF03113

Schizophrenia is the most complex and challenging mental illness. Mental health problems in Indonesia are very important health problems and must receive serious attention and management efforts for schizophrenia using antipsychotic medication. This study aims to describe the pattern of use of antipsychotic drugs in schizophrenic patients in a mental hospital in Bandung. This research method is a retrospective descriptive study using patient medical record data for the period January-March 2023 with a total sample of 100 patients. The results of the study showed that the characteristics of the male patients most often suffered from schizophrenia, namely 72 patients (72%) with an age range of 36-45 years, 36 patients (36%). The most widely used combined antipsychotic drug was Haloperidol + Trihexyphenidyl + Clozapine with a percentage of 17.72%, while the most widely used single antipsychotic drug was Risperidone with a percentage of 47.62%.

Keywords: Schizophrenia, Antipsychotics, Usage Patterns, Mental Hospitals