

ABSTRAK

Gagal ginjal kronik (GGK) merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian. GGK meningkat dari penyebab kematian ke-13 di dunia menjadi peringkat ke-10. GGK dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Teori *Web of causation* dapat menjelaskan faktor yang dapat memicu terjadinya GGK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan terjadinya GGK. Rancangan penelitian menggunakan *Cross Sectional* dengan sampel 62 pasien rawat jalan Rumah Sakit Al Islam Bandung yang diambil secara *purposive sampling*. Dengan variabel independen : usia, jenis kelamin, IMT, hipertensi, diabetes melitus, dan konsumsi minuman energi. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden dan data rekam medis yang diolah menggunakan uji *Chi Square*. Didapatkan sebagian besar memiliki usia beresiko, berjenis kelamin laki-laki, memiliki IMT normal/ideal, mengalami hipertensi dan diabetes melitus serta tidak mengkonsumsi minuman energi. Terdapat hubungan antara hipertensi terhadap kejadian GGK (*pvalue* : 0,026). Tidak terdapat hubungan usia (*pvalue* : 0,499), jenis kelamin (*pvalue* : 0,906), index masa tubuh (*pvalue* : 0,748), diabetes melitus (*pvalue* : 0,449), dan konsumsi minuman energi terhadap kejadian GGK (*pvalue* : 1,000). Rumah Sakit diharapkan mampu meningkatkan pelayanan promosi kesehatan guna pasien yang memiliki faktor pemicu terjadinya gagal ginjal kronis dapat terkendali.

Kata Kunci : Faktor, Gagal Ginjal Kronis, Web of Causation

Daftar Pustaka : 5 Buku, 13 Dokumen Pemerintah, 15 Jurnal, 8 Website Resmi (2010-2021)

ABSTRACT

Chronic kidney disease (CKD) is one of non-communicable diseases which became one of the main causes of death. . CKD increased from the cause of death of the 13th in the world to be a rank-10. . CKD can be caused by several factors.. The Web of causation theory can explain the factors related to CKD. . The purpose of this research is to figuring out the valuable factors in the development of CKD. The research design provided a Cross Sectional with a sample of 62 patients in Al Islam Bandung Hospital, which is based on purposive sampling. With independent variables : age, gender, IMT, hypertension, diabetes melitus, and consumption of energy drinks. The research instruments were conducted directly by the respondent and medical record were conducted during Clinical trials. Obtained most of the features of age at risk, sex male, have a BMI normal/ideal, having hypertension and diabetes mellitus as well as not consume energy drinks. There is a relationship between the hypertension on the CKD (pvalue : 0,026). There is no relationship of age (pvalue : 0,499), gender (pvalue : 0,906), body mass index (pvalue : 0,748), diabetes melitus (pvalue : 0,449), and consumption of energy drinks on the CKD (pvalue : 1,000). The Hospital is expected to improve service health promotion to patients who have factors trigger the onset of chronic renal failure can be controlled. Key Factors : Factors, Chronic Neural Failure, Web of Causation

Bibliography: 5 Books, 13 Government Documents, 15 Journals, 8 Official Website (2010-2021)