

ABSTRAK

Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya tanpa disertai tanda inpartu dan setelah satu jam tetap tidak diikuti dengan proses *inpartus* yang sebagian besar pecahnya ketuban secara dini terjadi sekitar usia kehamilan 37 minggu. Faktor penyebab KPD pada ibu hamil trimester III, diantaranya faktor infeksi, faktor trauma, faktor riwayat KPD yang lalu, faktor sosial ekonomi, faktor usia, faktor paritas, dan yang terakhir faktor *gemeli* dan *malpresentasi*. Dampak yang terjadi dari ISK, akan menyebabkan rusaknya selaput ketuban dan akan mengakibatkan peradangan pada selaput ketuban. Kondisi ini sangat berisiko meningkatkan *morbidity maternal* yakni risiko terjadi *sepsis*, tindakan *section caesaria*, histerektomi, *endometritis post partum*, perdarahan *post partum* dan bahkan kematian ibu. Mengetahui hubungan infeksi saluran kemih dengan ketuban pecah dini pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Cisempur Kabupaten Sumedang.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian studi kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *total sampling* sebanyak 132 ibu hamil trimester III, dengan menggunakan data sekunder dari catatan pelaporan Puskesmas Cisempur dengan melakukan analisis univariat dan bivariat, dalam analisis bivariat menggunakan pengujian *chi-square*.

Hasil didapatkan sebagian besar ibu hamil yang mengalami ISK sebanyak 52 ibu hamil dan sebagian besar ibu hamil yang mengalami KPD sebanyak 58 ibu hamil dengan hasil analisis statistik didapatkan nilai $p\text{-value} < 0,05$. Terdapat hubungan antar ISK dengan KPD pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Cisempur. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai faktor-faktor lain yang menyebabkan KPD pada ibu hamil trimester III.

Kata Kunci : Infeksi Saluran Kemih, Ketuban Pecah Dini, Trimester III
Sumber : 15 Buku (2012-2021)
18 Jurnal (2014-2021)
3 Situs (2016-2021)

ABSTRACT

It is the premature rupture of the amniotic eruption with no sign of the inpartu, and after an hour it is still not followed by a process that most of the early onset of the amniotic outbreak occurred around the age of pregnancy of 37 weeks. Causes in pregnant mothers trimester iii, including infection factors, trauma factors, history factors over the past, socioeconomic factors, age factors, parity factors, and finally a mild factor and malpresentations. The effect that occurs from the isk, will cause the breaking of the amniotic membrane and will result in inflammation of the amniotic membranes. This condition greatly risks increasing maternal morbidity, the risk of sepsis, section caesaria's actions, histerectomy, endometritis post mortem, post mortem hemorrhages and even mother's death. Knowing the relation of urinary tract infection with amrster broke early on pregnant mother trimester III in the Puskesmas Cisempur district of sumedang.

In this study is a quantitative study with a sectional approach to cross sectional using the 132 total sampling technique of trimester III, using a secondary data from cisempur reporting report by univariate and bivariate analysis, in the bivariate analysis using the chi-square test.

The result is that most pregnant mothers get the isk number 52 pregnant mothers and most expectant mothers get to as many as 58 pregnant mothers with statistical analysis of the value of 0,000 p-value. There is a connection between the isk and to the pregnant mother trimester III in the cisempur center. This study provides a guide, and researchers, in turn, can perform a study on other factors that lead to the pregnant mother of trimester III.

Keywords : Premature Rupture of Membranes, Third Trimester, Urinary Tract Infection

Source : 15 Books (2012-2021)
18 Journals (2014-2021)
3 Sites(2016-2021)