

ABSTRAK

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan kelompok penyakit atau gejala yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh diakibatkan infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Penemuan penting di dalam dunia kesehatan untuk menekan penyebaran virus HIV/AIDS yaitu dengan mengonsumsi obat antiretroviral (ARV) yang harus dikonsumsi secara teratur. Dukungan keluarga meliputi dukungan informasional, dukungan instrumental, dukungan penilaian, dan dukungan emosional terhadap pasien, sehingga dukungan keluarga berperan sangat besar dalam hal kepatuhan minum obat ARV pada ODHA dalam menjalani pengobatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat ARV.

Jenis penelitiannya menggunakan metode korelasional. Populasinya sebanyak 37 ODHA yang tinggal dengan keluarga menggunakan teknik *Total Sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dukungan keluarga berdasarkan teori Sarafino dan kuisioner kepatuhan minum obat berdasarkan MMAS. Analisis data dilakukan secara univariat dalam bentuk presentase dan frekuensi, bivariat menggunakan uji *Rank Spearman*.

Hasil penelitian menunjukkan dukungan keluarga baik 56.8% (21 orang), dan buruk sebanyak 43.2% (16 orang), kepatuhan minum obat dengan kategori patuh sebanyak 70.3% (26 orang), dan kategori tidak patuh sebanyak 29.7% (11 orang), hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat diperoleh nilai p 0,001 (α 0,05) dan nilai koefisien korelasi r 0,506, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan layanan bagi ODHA dan keluarga ODHA dengan memberikan edukasi atau konseling guna meningkatkan dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat ARV.

Kata Kunci : Dukungan keluarga, HIV/AIDS, Kepatuhan minum obat
Daftar Pustaka : 18 Buku (2012-2022)
17 Jurnal (2014-2022)

ABSTARCT

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is a group of diseases or symptoms caused by decreased immunity due to infection with the Human Immunodeficiency Virus (HIV). An important discovery in the world of health to suppress the spread of the HIV/AIDS virus is by taking antiretroviral (ARV) drugs that must be consumed regularly. Family support includes informational support, instrumental support, assessment support, and emotional support for the patient, so that family support plays a very big role in adherence to ARV medication for PLWHA in undergoing treatment. The purpose of this study was to determine the relationship between family support and adherence to ARV medication.

This type of research uses the correlational method. The population is 37 PLWHA who live with their families using the Total Sampling technique. The instruments used in this study were a family support questionnaire based on Sarafino's theory and a medication adherence questionnaire based on MMAS. Data analysis was carried out univariately in the form of percentages and frequency, bivariate using Spearman's Rank test.

The results showed that family support was good 56.8% (21 people), and bad as much as 43.2% (16 people), adherence to taking medication in the obedient category was 70.3% (26 people), and the non-adherent category was 29.7% (11 people). family support with medication adherence obtained p-value 0.001 (α 0.05) and correlation coefficient r 0.506, these results indicate that there is a relationship between family support and medication adherence. The implications of this study are expected to improve services for PLWHA and PLWHA families by providing education or counseling to increase family support for adherence to ARV medication.

Keywords : Family support, HIV/AIDS, medication adherence
Bibliography : 18 Books (2012-2022)
17 Journals (2014-2022)