

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari hasil penelitian Studi Penggunaan Obat Anti Hipertensi disimpulkan bahwa:

1. Pola pengobatan obat hipertensi berdasarkan jenis obat menunjukkan bahwa obat amlodipin 5 mg menjadi pilihan dosis monoterapi paling banyak diberikan sebesar 47.5 % dan obat amlodipine 10 mg dan furosemid 40 mg menjadi pilihan dosis politerapi paling banyak diberikan sebesar 10 %.
2. Pemberian ketepatan obat terhadap pasien hipertensi menunjukkan bahwa pengobatan rasional paling banyak diberikan pada pasien hipertensi tahap 2 sebanyak 43.75 %.

6.2 Saran

Berikut saran yang dapat diberikan berdasarkan data hasil penelitian dan kesimpulan diatas:

1. Intervensi universitas dalam hal ini prodi kefarmasian diharapkan dapat mendukung dan melanjutkan penelitian tentang pengobatan hipertensi yang lebih komprehensif dan mendalam.
2. Bagi tenaga kefarmasian diharapkan dapat melanjutkan penelitian tentang pengobatan hipertensi yang tepat agar pengobatan yang diberikan lebih cepat secara preventif maupun kuratif.