

ABSTRAK

Demam tifoid adalah infeksi sistemik yang disebabkan oleh *Salmonella Typhi*, orang yang terinfeksi typhoid dapat menularkan bakteri melalui feses atau urinenya, biasanya melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Jajanan sembarangan pada anak usia sekolah sangat rentan terjadi karena anak kurang memperhatikan perilaku jajan, mereka akan lebih memilih mengonsumsi makanan yang kebersihannya tidak terjamin atau terkontaminasi bakteri menjadikan tubuh yang sehat menjadi terinfeksi bakteri *Salmonella Typhi*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara jajan sembarangan dengan kejadian demam typhoid pada anak usia sekolah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review*, dengan desain penelitian *cross sectional*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jajan sembarangan, sedangkan variabel dependen adalah kejadian demam typhoid. Teknik pencarian artikel pada penelitian ini menggunakan database online jurnal dari *Google Scholar*, *PubMed* dan *Elsevier/ScienceDirect* dan mendapatkan 557 jurnal yang diambil menjadi sampel adalah 3 jurnal. Pengambilan sampel berdasarkan dari kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditentukan dan dianalisis menggunakan instrumen menggunakan: *Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal For Analytical Cross-Sectional*.

Hasil penelitian dari 3 jurnal yang digunakan sebagai sampel untuk mendapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara jajan sembarangan dengan kejadian demam typhoid pada anak usia sekolah. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan dilakukan kajian lebih lanjut tentang faktor-faktor resiko kejadian demam thyphoid karena masih sedikit peneliti an atau sumber tentang kejadian demam typhoid ditinjau dari berbagai faktor resiko. Selain itu menyediakan berbagai jenis makanan yang hygiene dan sehat.

Kata Kunci : Anak usia sekolah, demam *typhoid*, jajanan sembarangan.

Daftar Pustaka: 12 Buku (2010-2020)
18 Jurnal (2010-2020)
4 Website (2010-2020)

ABSTRACT

Typhoid fever is a systemic infection caused by Salmonella Typhi, a person infected with typhoid can transmit the bacteria through feces or urine, usually through consumption of contaminated food or water. Indiscriminate snacks at school-age children are very susceptible to occur because children pay less attention to snacking behavior, they will prefer to eat foods that are not guaranteed cleanliness or are contaminated with bacteria so that a healthy body becomes infected with Salmonella Typhi bacteria. The purpose of this study was to analyze the relationship between random snacking and the incidence of typhoid fever in school age children.

This type of research is using a Systematic Literature Review approach, with a cross sectional research design. The independent variable in this study was random snacks, while the dependent variable was the incidence of typhoid fever. The search technique for articles in the study used an online journal database from Google Scholar, PubMed and Elsevier / ScienceDirect and got 557 journals which were sampled from 3 journals. Sampling based on inclusion and exclusion criteria that have been determined and analyzed using instruments using: Joanna Brigs Institute (JBI) Critical Appraisal For Analytical Cross-Sectional.

The results of the study from 3 journals were used as samples to get the result that there was a significant relationship between reckless snacks and the incidence of typhoid fever in school-age children. The suggestion from this research is that it is hoped that further studies will be carried out on the risk factors for the incidence of typhoid fever because there are still few researchers or sources about the incidence of typhoid fever in terms of various risk factors. Besides that, it provides various types of food that are hygiene and healthy.

Keywords : School age children, snack carelessly, typhoid fever.

References : 12 Book (2010-2020)

18 Journal (2010-2020)

4 Website (2010-2020)