

ABSTRAK

Di dunia ini sekitar 56 juta abortus terjadi setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia saat ini diperkirakan 7-14% atau sekitar 560.000-1.100.000 kejadian abortus setiap tahunnya. Beberapa faktor predisposisi abortus yaitu faktor janin, faktor ayah dan ibu, pada faktor ibu riwayat abortus dan penyakit kronis juga disebutkan menjadi faktor yang dapat menyebabkan abortus salah satunya infeksi yang dapat terjadi pada ibu hamil yaitu toxoplasmosis yang dapat ditularkan melalui hewan pada manusia apabila manusia tidak sengaja menelan parasit tersebut sehingga dapat ditularkan oleh ibu kepada janin yang dikandungnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara toxoplasmosis dengan kejadian abortus berdasarkan *Literature Review*.

Jenis Penelitian ini menggunakan *Literature Review* dengan pendekatan *Systematic Literature Review*. Populasi berjumlah 677 jurnal yang diperoleh dari *Pubmed*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dengan memilih subjek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sampel penelitian sebanyak 5 artikel jurnal dan di uji kelayakan menggunakan *JB* (*Joana Briggs Institute*).

Hasil analisis dari kelima jurnal terdapat hubungan yang signifikan antara *toxoplasmosis* dengan kejadian abortus. Karakteristik kebiasaan memakan daging mentah, kebiasaan memakan sayuran mentah, keberadaan hewan peliharaan kucing di rumah, konsumsi sumber air dari sungai dapat merupakan faktor pencetus terinfeksi *toxoplasma gondii*.

Saran bagi perawat diharapkan untuk mulai mengkaji adanya faktor – faktor risiko yang berhubungan dengan *toxoplasmosis* sehingga bila ditemukan adanya faktor risiko, perawat dapat merujuk pasien untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kata Kunci : Abortus, Keguguran, *Toxoplasmosis*
Daftar Pustaka : 33 Buku (1998-2018)
3 Website (2011-2021)
17 Jurnal (2012-2021)

ABSTRACT

In this world about 56 million abortions occur every year. Meanwhile, in Indonesia, it is currently estimated at 7-14% or around 560,000-1,100,000 abortions every year. Several predisposing factors for abortion, namely fetal factors, father and mother factors, maternal factors, history of abortion and chronic disease are also mentioned as factors that can cause abortion, one of which is infection that can occur in pregnant women, namely toxoplasmosis which can be transmitted through animals to humans if humans do not accidentally ingesting the parasite so that it can be transmitted by the mother to the fetus it contains. The purpose of this study was to determine the relationship between toxoplasmosis and the incidence of abortion based on the Literature Review.

This type of research used a Literature Review with a approach Systematic Literature Review. The population is 677 journals obtained from Google Scholar and Pubmed. The sampling technique used was purposive sampling by selecting subjects based on predetermined criteria. The research sample consisted of 5 journal articles and was tested for feasibility using JBI (Joana Briggs Institute).

*The results of the analysed of the five journals showed a significant relationship between toxoplasmosis and the incidence of abortion. The characteristics of the habit of eating raw meat, the habit of eating raw vegetables, the presence of cat pets at home, consumption of water sources from rivers can be trigger factors for infection with *Toxoplasma gondii*.*

Suggestions for nurses are expected to start assessing the presence of risk factors associated with toxoplasmosis so that if any risk factors are found, nurses can refer patients for further examination.

Keywords : Abortion, Miscarriage, Toxoplasmosis

References : 33 Books (1998-2018)
3 Websites (2011-2021)
17 Journals (2012-2021)