

ABSTRAK

Latar Belakang : Kejadian preeklamsia di RSUD Sumedang terdapat 507 kasus yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya faktor umur dan paritas. Kejadian preeklamsia dengan penyumbang angka kematian ibu terbanyak di kota Sumedang Kejadian preeklamsia ringan 107 orang, preeklamsia berat 391 orang, eklamsi 9 orang , 5 orang meninggal karena preeklamsia dan 3 orang meninggal karena eklamsia. **Tujuan Penelitian :** Untuk mengetahui Gambaran Umur dan Paritas Ibu Hamil yang Mengalami Preeklamsia Di Ruang Bersalin RSUD Sumedang Tahun 2020. **Metode :** Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif dengan pendekatan cros sectional. **Populasi dan Sampel :** Populasi dalam penelitian ini sebanyak 507 responden dengan jumlah sampel dengan teknik *systematic random sampling* sebanyak 224 sampel. Teknik pengumpulan data : menggunakan data sekunder. **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan Ibu hamil yang mengalami pre eklamsia berdasarkan faktor umur dengan resiko rendah sebanyak 83,9% dan resiko tinggi sebanyak 16,1 %. Sedangkan ibu hamil dengan faktor paritas sebanyak 37,1% dengan resiko tinggi dan 62,9% dengan resiko rendah. **Kesimpulan dan saran :** Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor umur dan paritas berpengaruh untuk terjadi preeklamsia., saran peneliti rumah sakit harus menjalin kerja sama dengan responden agar dapat memperhatikan kehamilannya terutama memperhatikan faktor umur dan paritas baik dengan cara pemberian informasi dan intervensi untuk mencegah faktor yang dapat mempengaruhi kejadian preeklamsi pada kehamilan.

Kata kunci : preeklamsia, paritas dan umur

Daftar Pustaka: 11 Jurnal (2011-2021)

6 buku (2011-2021)

ABSTRACT

Background : The incidence of preeclampsia in Sumedang Hospital there were 507 cases that occurred influenced by various factors, one of which was age and parity. The incidence of preeclampsia with the largest contributor to maternal mortality in the city of Sumedang The incidence of mild preeclampsia 107 people, severe preeclampsia 391 people, eclampsia 9 people, 5 people died of preeclampsia and 3 people died from eclampsia. **The purpose of the study:** To determine the description of the age and parity of pregnant women with preeclampsia in the maternity ward of Sumedang Hospital in 2020. **Methods:** The type of research used is a quantitative type with a cross sectional approach. **Population and Sample:** The population in this study was 507 respondents with a total sample systematic random sampling technique of 224 samples using ausung the chi square formula. **Data collection techniques:** using secondary data. **Results:** The results showed that pregnant women who had pre-eclampsia based on age had a low risk of 83.9% and a high risk of 16.1%. Meanwhile, pregnant women with parity factor were 37.1% with high risk and 62.9% with low risk. **Conclusions and suggestions:** Based on the results of this study, it can be concluded that age and parity factors influence the occurrence of preeclampsia, Suggestions for hospital researchers to collaborate with respondents so that they can pay attention to their pregnancy, especially paying attention to age and parity factors both by providing information and interventions to prevent factors that can affect the incidence of preeclampsia in pregnancy/

Keywords : preeclampsia, age and parity

Bibliography : 11 journals (2011-2021)

6 books (2011-2021)