

ABSTRAK

Latar Belakang: Hipertensi dalam kehamilan adalah suatu keadaan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg. Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15% komplikasi kehamilan dan merupakan salah satu dari 3 pemicu kematian dan kesakitan ibu tertinggi. **Tujuan Penelitian:** mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada kehamilan di RSUD Kota Bandung. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. **Populasi dan Sampel :** Populasi dalam penelitian ibu hamil dengan hipertensi di RSUD Kota Bandung tahun 2020 adalah 64 sampel orang dengan teknik total sampling. **Teknik Pengumpulan Data :** Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari RSUD Kota Bandung berupa rekam medis pasien hipertensi dalam kehamilan. Analisis data menggunakan analisis univariat. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian, kejadian hipertensi pada kehamilan di RSUD Kota Bandung berdasarkan usia, sebagian kecil pada usia <20 tahun dan mayoritas pada usia 20-35 tahun. Berdasarkan paritas, sebagian kecil belum memiliki anak dan mayoritas primipara. Berdasarkan graviditas yang merupakan proporsi kecil pada primigravida dan mayoritas multigravida. **Kesimpulan dan Saran:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada kehamilan di RSUD Kota Bandung sebagian besar terjadi pada ibu usia 20-35 tahun, primipara dan multigravida. Saran bagi pihak RSUD Kota Bandung sebaiknya dapat membuat jadwal penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil di wilayah kerja RSUD Kota Bandung secara rutin terkait skrining hipertensi pada kehamilan dapat dideteksi secara dini agar dapat menurunkan angka hipertensi pada kehamilan.

Kata kunci: Hipertensi dalam kehamilan, Usia, Paritas, Graviditas

Daftar Pustaka : 1 buku

13 Jurnal

ABSTRACT

Background: Hypertension in pregnancy is a condition of systolic blood pressure above 140 mmHg and diastolic blood pressure above 90 mmHg. Hypertension in pregnancy is 5-15% of pregnancy complications and is one of the 3 highest triggers of maternal mortality and morbidity. **Research Objectives:** to describe the factors that influence the incidence of hypertension in pregnancy in RSUD Kota Bandung. **Methods:** this research method uses descriptive research. **Population and Sample:** The population in the study of pregnant women with hypertension at the RSUD Kota Bandung in 2020 was 64 samples of people with a total sampling technique. **Data Collection Techniques :** the data collected in this study is secondary data from the RSUD Kota Bandung in the form of medical records of patients with hypertension in pregnancy. Data analysis used univariate analysis. **Results:** Based on the results of the study, the incidence of hypertension in pregnancy in RSUD Kota Bandung based on age, a small proportion at the age of <20 years and the majority at the age of 20-35 years. Based on parity, a small proportion have not had children and majority primiparous. Based on the gravidity that is a small proportion in primigravida and majority multigravida. **Conclusions and Suggestions:** based on the results of the study, it can be concluded that the description of the factors that influence the incidence of hypertension in pregnancy in RSUD Kota Bandung mostly occurs in mothers aged 20-35 years, primipara and multigravida. Suggestions for the RSUD Kota Bandung should be able to make a schedule of health education for pregnant women in the work area of RSUD Kota Bandung routinely related to screening for hypertension in pregnancy can be detected early in order to reduce the rate of hypertension in pregnancy.

Keywords: Hypertension in pregnancy, Age, Parity, Gravidity

Bibliography : 1 book

13 Journals