



Riya Wati

NIM : AKX18035

ABSTRAK

Di Indonesia, angka insidensi kasus demam typhoid masih termasuk tinggi di Asia, yakni 81 kasus per 100.000 per tahun. Berdasarkan prevalensi demam typhoid anak di Indonesia lebih sering terjadi pada anak kelompok usia sekolah 2-15 tahun yaitu 62,0% (98 orang) . Di provinsi Jawa Barat dengan prevalensi 1,61% dan tersebar diseluruh kabupaten dan kota dengan prevalensi yang berbeda . Menurut data dari puskesmas Tanjungsari kasus demam *typhoid* pada anak usia sekolah (6-12 tahun) yang berobat pada tahun 2020 dengan jumlah total 191 orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang demam *typhoid* pada anak usia sekolah (6-12 tahun) di Sembungrugul

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, populasi dan sampel pada penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai anak usia sekolah di daerah sembungrugul berjumlah 30 orang dengan menggunakan metode penelitian total sampling, teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, Analisa data yang digunakan univariat.

Hasil penelitian menunjukan sebagian responden memiliki pengetahuan kurang yaitu sebanyak (53%), cukup sebanyak (30%) dan baik sebanyak (17%). Simpulannya masih banyak responden yang memiliki pengetahuan yang kurang dan kurang memahami terkait demam *typhoid*. Disarankan kepada pihak pelayanan kesehatan agar memberikan penyuluhan tentang demam *typhoid* kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Sembungrugul agar dapat memberikan dan menambah informasi terkait penyakit *typhoid*.

Kata Kunci : Pengetahuan, Demam Typhoid

Daftar Pustaka : 9 Buku (2011-2018)

5 Jurnal (2010-2018)

ABSTRAC

In Indonesia, the incidence rate of typhoid fever cases is still high in Asia, namely 81 cases per 100,000 per year. Based on prevalence of typhoid fever in children in Indonesia is more common in children in the school age group of 2-15 years, namely 62.0% (98 people). In the province of West Java with a prevalence of 1.61% and spread across districts and cities with different prevalence. According to data from the Tanjungsari Public Health Center, there were 191 cases of typhoid fever in school-age children (6-12 years) seeking treatment in 2020. The purpose of this study was to describe the mother's knowledge about typhoid fever in school-age children (6-12 years) in Sembungrugul.

The type of research used in this research is descriptive quantitative, population research and the sample in this study were all mothers who had school-age children in the Sembungrugul area totaling 30 people using the total sampling research method, data collection techniques using questionnaires, data analysis used univariate .

The results showed that some respondents had less knowledge as much as (53%), quite as much (30%) and good as much (17%). In conclusion, there are still many respondents who have less knowledge and lack of understanding related to typhoid fever. It is recommended to the health service to provide counseling about typhoid fever to people who live in the Sembungrugul area in order to provide and add information related to typhoid disease.

Keywords: Knowledge, Typhoid Fever

Bibliography : 9 Books (2011-2018)