

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari studi pustaka yang berasal dari 10 jurnal utama mengenai penggunaan NSAIDs pada terapi osteoarthritis pasien geriatri, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Obat golongan NSAIDs yang umum digunakan adalah meloxicam terdapat pada 4 jurnal, natrium diklofenak dan ibuprofen terdapat pada 5 jurnal, naproxen terdapat pada 2 jurnal, etoricoxib terdapat pada 2 jurnal dan celecoxib yang terdapat pada 2 jurnal.
2. Obat golongan NSAIDs yang paling banyak digunakan pada terapi osteoarthritis pasien geriatri adalah celecoxib dengan jumlah pengobatan terhadap 426 pasien (31,36%).

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan jurnal-jurnal yang direview, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis pemberian obat karena penggunaan obat-obat NSAIDs ini memiliki resiko efek samping yang tinggi namun data yang berkaitan dengan dosis obat terhadap pasien geriatri tersebut pada beberapa jurnal masih kurang lengkap sehingga ketepatan dosis pemberian obat NSAIDs ini belum banyak diketahui.