

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Berdasarkan karakteristik umur pasien balita diare di klinik anak Rumah Sakit Swasta di Bandung periode Januari-Februari 2020 yang paling banyak terkena diare adalah pada kelompok umur 0-12 bulan dengan persentase 53,60%.
2. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin pasien balita diare yang paling besar persentasenya adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 57,21%.
3. Kesesuaian pola peresepan *zinc* pada pasien balita diare adalah suplemen *zinc*, elektrolit, probiotik, dan antibiotik. Kesesuaian dibandingkan dengan buku Panduan Sosialisasi Tatalaksana Diare Balita yang berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 adalah 215 kasus atau 96,84% dan 7 kasus hanya terdiri dari terapi antibiotik sebesar 3,16%.

VI. 2. Saran

Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai sejauh mana efektivitas suplementasi *zinc* pada balita terkena diare dibandingkan dengan pasien balita yang tidak mendapat suplementasi *zinc*.