

KAJIAN PENYEBAB PASIEN TUBERCULOSIS TIDAK MENUNTASKAN PENGobatan RUTIN DI FASILITAS KESEHATAN

ABSTRAK

Pendahuluan : Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Penyakit ini ditularkan melalui droplet atau percikan dahak penderita tuberkulosis. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidaktuntasan pengobatan pasien tuberkulosis di fasilitas kesehatan. Metode penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan review jurnal. Hasil : dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab ketidaktuntasan pengobatan pasien tuberkulosis di fasilitas kesehatan yang lebih banyak terjadi adalah tingkat pengetahuan yang rendah mengenai penyakit tuberkulosis dan peranan (PMO) pengawas minum obatrans terhadap penanganan penderita TB. Kesimpulan : berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akses menuju fasilitas kesehatan, efek samping obat, tingkat pengetahuan, peranan pengawas minum obat (PMO) dan dukungan dari keluarga merupakan faktor penyebab ketidaktuntasan penderita dalam menjalankan pengobatan tuberkulosis.

Kata kunci : Ketidaktuntasan pengobatan, Pengetahuan pasien, Akses, Efek samping, PMO

ABSTRACT

Introduction: Tuberculosis, hereinafter abbreviated as TB is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis, which can attack the lungs and other organs. This disease is transmitted through droplets or sputum sputum patients with tuberculosis. Objective: This study aims to analyze the causes of treatment incomplete tuberculosis patients in health facilities. Research methods: The type of research used in this study is a journal review. Results: From the results of this study it can be concluded that the factors that cause more incomplete treatment of tuberculosis patients in health facilities are the low level of knowledge about tuberculosis and the role of the PMO (supervisors taking medication) on the handling of TB patients. Conclusion: based on the results of this study it can be concluded that access to health facilities, side effects of drugs, level of knowledge, the role of supervisors taking medication (PMO) and support from the family are the factors causing incomplete patient in carrying out tuberculosis treatment.

Keyword : Treatment incompleteness, Patient's knowledge, Access, Side effects, PMO