

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien rawat inap dan rawat jalan ulkus diabetikum di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Bandung adalah

1. Pola penggunaan antibiotik pada pasien dengan ulkus diabetikum, adalah ceftriaxone, cefixime, dan ceftizoxime digunakan secara tunggal sebesar 87,80%, dengan ceftizoxime dan metronidazole yang paling sering digunakan sebesar 24%
2. Evaluasi ketepatan penggunaan antibiotik pada 63 dengan ulkus diabetikum menunjukkan persentase tepat indikasi sebesar 100%, tepat obat sebesar 90,48%, dan tepat dosis sebesar 98,41%. Dalam hal potensi interaksi obat, terdapat resep dengan potensi interaksi sebesar 33,33% dan resep tanpa potensi interaksi sebesar 66,66%.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam hal mengevaluasi penggunaan antibiotik pada pasien ulkus diabetikum serta mempertimbangkan potensi interaksi obat yang mungkin saja terjadi.