

POLA PENGGUNAAN OBAT DISPEPSIA PADA PASIEN DISPEPSIA DI PUSKESMAS CIMAUNG

ABSTRAK

Dispepsia merupakan kumpulan gejala yang mengarah pada penyakit atau gangguan saluran pencernaan atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan obat dispepsia di Puskesmas Cimaung berdasarkan jenis kelamin, umur dan jenis obat yang paling banyak digunakan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode retrospektif dengan cara mengumpulkan data resep periode Januari sampai dengan Maret 2020. Hasil dari penelitian penggunaan obat dispepsia berdasarkan jenis kelamin pada laki-laki (653 resep) dan pada perempuan (765 resep). Penggunaan obat berdasarkan umur pada anak-anak (134 resep), pada remaja (98 resep), pada dewasa (660 resep) dan pada lansia (526 resep). Penggunaan obat dispepsia berdasarkan jenis obat yang digunakan Ranitidin (162 resep), Antasida (466 resep), Omeprazole (366 resep), Antasida + Omeprazole (365 resep), Ranitidin + Omeprazole (54 resep) dan Antasida + Ranitidin (5 resep). Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penggunaan obat berdasarkan jenis kelamin pada perempuan dengan persentase 53,95%. Penggunaan obat berdasarkan umur pada dewasa dengan persentase 46,54%. Jenis obat yang paling banyak digunakan adalah Antasida dengan persentase 32,86%.

Kata Kunci: Dispepsia; Pola Penggunaan obat; Resep

**PATTERN OF DYSPEPSIA DRUG USE OF DYSPEPSIA PATIENT IN
PUSKESMAS CIMAUNG**

ABSTRACT

Dyspepsia is a collection of symptoms that lead to diseases or disorders of the upper digestive tract. The purpose of this study was to determine the pattern of dyspepsia drug use at the Cimaung Health Center based on sex, age and the type of drug most used. The research method used in this research is descriptive with a retrospective method by collecting prescription data from January to March 2020. Results from the study of dyspepsia drug use by sex in men (653 prescriptions) and in women (765 prescriptions). The use of drugs is based on age in children (134 prescriptions), in adolescents (98 prescriptions), in adults (660 prescriptions) and in the elderly (526 prescriptions). The use of dyspepsia drugs based on the type of drug used Ranitidine (162 recipes), Antacids (466 recipes), Omeprazole (366 recipes), Antacids + Omeprazole (365 recipes), Ranitidine + Omeprazole (54 recipes) and Antacids + Ranitidine (5 recipes). Conclusions from studies conducted using sex-based drugs in women with a percentage of 53.95%. The use of drugs by age in adults with a percentage of 46.54%. The most widely used type of drug is Antacids with a percentage of 32.86%.

Keywords: Dyspepsia; Drug use patterns; Prescription