

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan cara pengumpulan data retrospektif yaitu penelitian yang dilakukan dengan gambaran atau deksripsi yang melihat ke belakang dimulai dari pengumpulan data berdasarkan resep yang ada.

III.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2021 s/d selesai disalah satu Rumah Sakit Negeri di Kota Bandung.

III.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

III.1.1 Populasi

Populasi yang digunakan adalah lembar resep obat antihipertensi amlodipin periode Mei 2021 di Rumah Sakit tersebut.

III.1.2 Sampel

Sampel yang digunakan adalah lembar resep yang terdapat obat antihipertensi amlodipin periode Mei 2021 di Rumah Sakit tersebut.

III.4 Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data adalah dengan pengamatan observasi. Dimana observasi ini adalah menganalisa resep obat antihipertensi amlodipin. Lalu dilakukan pendataan terhadap resep-resep yang megandung obat antihipertensi amlodipin.

III.5 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2. Definisi Operasional

| No | Variabel | Definisi Operasional | Skala |
|----|---------------------------------|---|---------|
| 1. | Profil Peresepan Antihipertensi | Resep-resep obat antihipertensi berdasarkan karakter pasien dan karakter obat. | Nominal |
| 2. | Karakter Pasien | Pasien hipertensi yang menerima resep yang meliputi jenis kelamin dan usia. | Nominal |
| 3. | Jenis Kelamin | Laki-laki dan perempuan yang menderita hipertensi. | Nominal |
| 4. | Usia | Usia pasien hipertensi yang datang ke Rumah Sakit tersebut. | Nominal |
| 5. | Jenis obat antihipertensi | Jenis obat yang digunakan dari masing-masing golongan antihipertensi. | Nominal |
| 6. | Aturan pakai | Aturan pakai jumlah obat antihipertensi yang digunakan dalam sehari. | Nominal |
| 7. | Kombinasi Obat | Obat antihipertensi yang dikombinasikan dengan obat antihipertensi dari golongan antihipertensi yang berbeda. | Nominal |