

# **GAMBARAN PENGOBATAN GANGGUAN LAMBUNG DISALAH SATU KLINIK DI KOTA BANDUNG**

## ***ABSTRAK***

Gangguan lambung merupakan keadaan dimana terjadi gangguan saluran pencernaan, dengan ciri khas rasa nyeri atau rasa tidak nyaman disekitar ulu hati, diikuti dengan keluhan-keluhan seperti kembung, mual, cepat kenyang, nafsu makan berkurang, dan sering sendawa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengobatan gangguan lambung di salah satu Klinik di Kota Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat non analitik, parameter yang diamati berdasarkan jenis kelamin, usia, kombinasi obat serta urutan obat gastritis yang paling sering diresepkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara retrospektif. Hasil penelitian dengan menggunakan subjek resep sebanyak 597 lembar, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit gastritis berdasarkan jenis kelamin pada perempuan 63,82%, laki-laki 36,18%, berdasarkan usia pada usia 17-25 tahun 13,40%, usia 26-35 tahun 12,40%, berdasarkan usia pada usia 17-25 tahun 13,40% , usia 26-35 tahun 12,40%, usia 36-45 tahun 24,80%, usia 46-55 tahun 22,78%, usia 56-65 tahun 16,41%, usia 65-keatas 10,21%, dan berdasarkan kombinasi obat yaitu antasida+ranitidine 50,65%, antasida+omeprazole 28,67%, ranitidine+omeprazole 3,57%, antasida+antimetika 3,90%, ranitidine+antimetika 8,12%, antasida+ranitidine+antimetika 5,19%. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa golongan Antasida dan H2 Blocker paling banyak digunakan.

Kata kunci: Antasida, Gastritis, Klinik, Ranitidin.

## **ABSTRACT**

*Gastric disorders are conditions where digestive tract disorders occur, with characteristic pain or discomfort around the solar plexus, followed by complaints such as bloating, nausea, fast satiety, reduced appetite, and frequent belching. The purpose of this study is to find out the picture of the treatment of gastric disorders in one of the clinics in the city of Bandung. This study is a non-analytical study, parameters observed based on gender, age, drug combinations and the order of gastritis drugs that are most often prescribed using retrospective data collection techniques. The results of the study using prescription subjects as many as 597 sheets, where the results of the study showed that gastritis disease by sex in women was 63.82%, men 36.18%, based on age at the age of 17-25 years 13.40%, age 26-35 years 12.40%, based on age at the age of 17-25 years 13.40%, age 26-35 years 12.40%, age 36-45 years 24.80%, age 46-55 years 22.78%, age 56-65 years 16.41%, age 65-and above 10.21%, and based on drug combinations, namely antacidine + ranitidine 50.65%, antacid + omeprazole 28.67%, ranitidine + omeprazole 3.57%, antacidine + antimetic 3.90%, ranitidine + antimetics 8.12%, antacidine + ranitidine + antimetics 5.19%. The conclusion of the results of the study showed that the Antacid and H2 Blocker groups were most widely used.*

*Keywords: Antacid, Clinic, Gastritis, Ranitidine.*