

STUDI PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI DI UPT PUSKESMAS CIBUNTU

ABSTRAK

Hipertensi maupun tekanan darah tinggi adalah keadaan paling umum timbul dari orang dewasa daripada dari permasalahan kesehatan lain serta termasuk faktor risiko pada penyakit kardiovaskular. Hipertensi guna pria serta wanita mempunyai prevalensi sama. Prevalensi meningkat dari bertambahnya usia serta dalam orang dewasa tua, prevalensi orang dewasa paling tinggi ialah dalam orang dewasa hitam non-Hispanik. Motivasi adalah sebuah dorongan, harapan serta tenaga menggerakkan yang berawal pada dalam diri seorang guna melaksanakan sesuatu dalam menyampingkan hal-hal yang dianggapnya kurang ada manfaatnya. Motivasi yang kuat berawal pada diri pasien hipertensi guna sembuh dan memberi pembelajaran yang berharga. Tahap guna jaga tekanan darah pasien hipertensi tak sekedar dalam merawat non farmakologi misalnya olahraga, tetapi dilaksanakan dalam cara pengobatan farmakologi. Pengobatan farmakologi didapat salah satu pada cara melaksanakan kontrol kepada puskesmas. Pengobatan pasien hipertensi lansia dalam puskesmas yang rutin seperti pada jadwal kunjungan, bisa percepat keadaan tekanan darah pasien hipertensi lansia masih terjaga secara norma. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengertian kualitatif menurut para ahli tersebut bisa ditarik kesimpulan jika penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan tulisan, ucapan maupun perilaku mengenai permasalahan yang sedang diamati melalui kata-kata. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil pengamatan lapangan berupa tulisan, ucapan serta perilaku terutama pada pasien hipertensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kriteria berdasarkan jenis kelamin yaitu pada perempuan dengan persentase sebesar 57,64% dan laki-laki sebesar 42,35%. Kemudian karakteristik usia dapat diperoleh penyebabnya terjadinya hipertensi menurut faktor umur berusia 46-65 tahun sebanyak 98 orang dengan persentase (57,64%). Obat hipertensi yang sering digunakan di UPT Puskesmas Cibuntu yaitu amlodipine 5 mg, dengan jumlah 105 atau sebesar (61,76%).

Kata kunci: Etiologi, Hipertensi, Klasifikasi, dan patofisiologi.

**STUDY ON THE USE OF ANTIHYPERTENSION MEDICINE AT UPT
PUSKESMAS CIBUNTU**

ABSTRACT

Hypertension or high blood pressure is the most common condition in adults compared to other health problems and is a risk factor for cardiovascular disease. Hypertension for men and women has a similar prevalence. Prevalence increases with age and in older adults, the highest adult prevalence is in non-Hispanic black adults. Motivation is the drive, desire and driving force that comes from within a person to do something to the exclusion of things that are considered less useful. Strong motivation that comes from hypertensive patients to recover will provide valuable lessons. The process to maintain blood pressure in hypertensive patients is not only done by non-pharmacological treatments such as exercise, but also by means of pharmacological treatment. Pharmacological treatment is obtained, one of which is by controlling it at the puskesmas. Treatment of elderly hypertensive patients at the health center regularly according to the schedule of visits, will speed up the condition of the blood pressure of elderly hypertensive patients to be maintained with the norm. This research method uses qualitative methods, according to the experts above, it can be concluded that qualitative research is research that describes writing, speech and behavior regarding the problems being observed through words. In this study, researchers describe the results of field observations in the form of writing, speech and behavior, especially in hypertensive patients. The results of this study indicate that the criteria are based on gender, namely in women with a percentage of 57.64% and men by 42.35%. Then the age characteristics can be obtained the cause of hypertension according to the age factor aged 46-65 years as many as 98 people with a percentage (57.64%). Hypertension drugs that are often used at UPT Puskesmas Cibuntu are amlodipine 5 mg, with a total of 105 or (61.76%).

Keywords: *Etiology, classification, Hypertensio and pathophysiology.*