

ABSTRAK

Latar Belakang : Chronic Kidney Disease (CKD)/ Gagal ginjal kronik terjadi akibat kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan serta elektrolit sehingga menimbulkan adanya kelebihan volume cairan. Oleh karena itu, pasien gagal ginjal kronik dengan kelebihan volume cairan harus dilakukan pengaturan atau pembatasan cairan input dan output untuk mencegah komplikasi akibat kelebihan volume cairan. **Tujuan :** Mampu melakukan Asuhan Keperawatan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Dengan Kelebihan Volume Cairan Di RSUD dr. Slamet Garut. **Metode :** Studi kasus dilakukan untuk mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan pada pasien dengan Gagal Ginjal Kronik dan cara pengambilan datanya menyertakan berbagai sumber. Studi kasus ini dilakukan pada dua orang pasien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan kelebihan volume cairan. Hasil : Kelebihan volume cairan : setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan memberikan intervensi keperawatan, masalah keperawatan Kelebihan Volume Cairan dengan dilakukan tindakan asuhan keperawatan 3x24 jam pada kedua pasien masalah baru teratasi sebagian dan hasil evaluasi belum sesuai dengan kriteria yang direncanakan. **Diskusi :** Pasien gagal ginjal kronis dengan masalah keperawatan kelebihan volume cairan tidak selalu memiliki respon yang sama. Hal ini dipengaruhi kondisi atau status kesehatan pasien sebelumnya. Sehingga perawat mampu melakukan asuhan keperawatan dengan melakukan pemantauan cairan intake dan output.

Kata Kunci : Chronic Kidney Disease (CKD), Kelebihan Volume Cairan, Asuhan Keperawatan

Daftar Pustaka : 5 buku (2014-2015), 5 jurnal (2016-2018), 12 Website

ABSTRACT

Background: Chronic kidney disease (CKD) occurs due to the body's ability to fail to maintain metabolism and balance of fluids and electrolytes, causing excess fluid volume. Therefore, patients with chronic renal failure with excess fluid volume should adjust or restrict fluid input and output to prevent complications due to excess fluid volume. **Objective:** Able to provide nursing care to patients with chronic kidney failure with excess fluid volume in dr. Slamet Garut. **Methods:** A case study was conducted to explore the problem of nursing care in patients with Chronic Renal Failure and data collection methods included various sources. This case study was conducted on two chronic renal failure patients with nursing problems with fluid volume overload. **Results:** Excess fluid volume: after nursing care by providing nursing interventions, the problem of excess fluid volume was carried out by taking 3x24 hours of nursing care for both patients, the problem was partially resolved and the results of the evaluation were not in accordance with the planned criteria. **Discussion:** Chronic renal failure patients with nursing problems with fluid volume overload do not always have the same response. This is influenced by the patient's previous health condition or status. So that nurses are able to perform nursing care by monitoring fluid intake and output.

Keywords: Chronic Kidney Disease (CKD), Excess Fluid Volume, Nursing Care

Referencess : 5 books (2014-2015), 5 journals (2016-2018), 12 websites