

BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil analisis yang didapat dari beberapa literatur dapat disimpulkan bahwa:

- a. Antibiotik yang banyak digunakan untuk penatalaksanaan diare pada penelitian ini adalah kotrimoksazol, metronidazol dan ceftriaxon.
- b. Terdapat interaksi obat loperamid dengan kotrimoksazol sebanyak 56,63% dan interaksi obat loperamid dengan metronidazol sebanyak 24,1% dengan mekanisme interaksi farmakokinetik dan tingkat keparahan *moderate*.

6.2 Saran

- a. Dalam meresepkan obat kepada pasien selama rawat jalan, sebaiknya lebih diperhatikan pemberian obat khususnya kombinasi loperamid dengan obat lain kepada pasien, karena dapat merugikan kondisi pasien yang dapat mengakibatkan kemungkinan pertambahan perawatan maupun perpanjangan lama penyembuhan.
- b. Kepada apoteker, sebagai tenaga kesehatan yang lebih memahami mengenai obat dan efeknya jika terjadi interaksi dari kombinasi obat, agar lebih berhati-hati dalam melayani resep sebelum diberikan kepada pasien.