

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Gambara faktor-faktor penyebab terjadinya preeklamsia berat di RSUD Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2018, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kurang dari setengah responden mengalami preeklamsia berat berusia <20 tahun dan >35 tahun.
2. sebagian kecil responden mengalami preeklamsia berat karena pendidikan yang rendah.
3. Sebagian kecil responden mengalami preeklamsia berat karena ibu bekerja.
4. lebih dari setengah responden mengalami preeklamsia berat dengan paritas 1 dan >3
5. Kurang dari setengah responden mengalami preeklamsia berat karena faktor keturunan.
6. Sebagian kecil responden mengalami preeklamsia berat karena faktor riwayat penyakit.

5.2 Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat dijadikan sumber bacaan dan menambah referensi tentang kejadian preeklamsia berat bagi mahasiswa dalam membuat Laporan Tugas Akhir selanjutnya, sehingga dapat terwujudnya bidan yang kompeten.

2. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk selalu memperhatikan kejadian preeklamsia berat. Karena preeklamsia berat dapat terjadi pada ibu hamil yang tidak mempunyai resiko sekalipun.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melihat faktor yang dapat melatarbelakangi terhadap kejadian preeklamsia berat dan menyertakan variable lain.