

ABSTRAK

Preeklamsia adalah hipertensi yang terjadi setelah kehamilan 20 minggu disertai proteinurin. Di Kabupaten Bandung penyebab kematian ibu tertinggi adalah akibat Hipertensi Dalam Kehamilan (34,55%). RSUD Soreang adalah rumah sakit umum di daerah Kabupaten Bandung dan merupakan salah satu rumah sakit rujukan untuk kasus kebidanan, yang mempunyai jumlah komplikasi kehamilan yang tinggi, yaitu tercatat sebanyak 192 orang ibu hamil dengan preeklamsia berat.

Tujuan penelitian ini untuk diketahuinya gambaran faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya preeklamsia berat di RSUD Soreang pada Tahun 2018.

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi penelitian adalah semua ibu hamil dengan diagnose preeklamsia berat yang tercatat di rekamedik RSUD Soreang tahun 2018. Sampel penelitian menggunakan total sampling dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 175 ibu hamil dengan preeklamsia berat.

Hasil penelitian menunjukkan Gambaran faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya preeklamsia berat di RSUD Soreang yaitu lebih dari setengah responden dengan jumlah paritas 1 dan >3 mengalami preeklamsia berat karena faktor paritas.

Kesimpulan dari penelitian ini dari faktor-faktor yang di teliti faktor paritas yang lebih mempengaruhi penyebab terjadinya preeklamsia berat di RSUD Soreang tahun 2018. Saran diharapkan menjadi sumber bacaandan referensi tentang preeklamsia berat.

KATA KUNCI: Preeklamsia berat, riwayat penyakit, keturunan, usia, paritas, pendidikan, pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA: 17 (2009-2018)