

BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian untuk mendapatkan gambaran pola penggunaan antipsikotik terhadap pasien skizofrenia di salah satu Klinik Kota Bandung telah dilakukan. Dari penelitian yang mengikutsertakan 166 rekam medik ini dapat dibuat simpulan dan saran.

VI.1 Simpulan

1. Penggunaan obat antipsikotik yang paling banyak digunakan di Klinik yaitu kombinasi tipikal-atipikal sebanyak 123 pasien dengan persentase 74% lebih besar dari penggunaan obat tunggal tipikal dan tunggal atipikal yaitu sebanyak 43 pasien dengan persentase jumlah 26%. Kombinasi obat antipsikotik yang menjadi pilihan terbanyak untuk digunakan sebagai pengobatan skizofrenia ialah kombinasi obat antara haloperidol-trifluoperazin-klozapin sebesar 11% dan antipsikotik tunggal yang banyak terpilih ialah antipsikotik atipikal risperidon sebesar 35%. Untuk Penggunaan obat tambahan selain antipsikotik yang paling banyak digunakan yaitu obat triheksifenidil dengan persentase 41%.
2. Penggunaan obat antipsikotik berdasarkan kesesuaian dosis terapi antipsikotik didapatkan semua antipsikotik mendapatkan persentase 100% sesuai dengan literatur yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu dipiro tahun 2020.

VI.2 Saran

Berdasarkan penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai masukan untuk salah satu Klinik di Kota Bandung ialah untuk mendapatkan laporan harian pasien skizofrenia yang lengkap dan akurat dapat dilakukan pelatihan pengisian laporan harian termasuk resosialisasi kode diagnosis. Selain itu perlu dilakukan pengawasan pengisian laporan harian untuk meminimalisir kesalahan atau ketidaklengkapan catatan.