

ABSTRAK

Gagal ginjal kronik (GGK) adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan tidak dapat pulihkan kembali, untuk keberlangsungan hidup pasien biasanya melakukan terapi hemodialisa. pasien GGK (gagal ginjal kronik) yang sedang menjalani terapi hemodialisis biasanya rentan mengalami: gangguan psikososial, contohnya menarik diri, depresi, putus asa, cemas dan merasa dirinya tidak berdaya (Tokala, Kandou, & Dundu, 2015). Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik ditinjau dari *Literature Review*. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* Pencarian data menggunakan tiga *database* yaitu *Google Scholar* dan *PubMed*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 3.478 artikel jurnal. Pada penelitian ini didapatkan sample berjumlah 5 literatur yang layak dan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dan telah dinilai melalui analisis *critical appraisal* dengan menggunakan JBI.

Berdasarkan hasil analisis dari 5 jurnal yang dijadikan sample penelitian *Literature Review* ini didapatkan bahwa 4 jurnal ada hubungan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. faktor yang menyebabkan tingkat depresi meningkat dan memperburuk kualitas hidup pasien saat melakukan hemodialisa adalah terganggunya faktor psikologis pasien. sedangkan faktor yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik diantaranya adalah tingkat depresi itu sendiri.

Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa dengan variabel yang lebih spesifik tentang psikologis pasien GGK

Kata kunci : Tingkat Depresi, Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik, Hemodialisa.

Daftar Pustaka : 2 Website (2019-2021)
12 Jurnal (2011-2021)

ABSTRACT

Chronic kidney failure (CKD) is a progressive and irreversible kidney function disorder, for survival, patients usually undergo hemodialysis therapy. Patients with CKD (chronic kidney failure) who are undergoing hemodialysis therapy are usually prone to experiencing: psychosocial disorders, for example withdrawal, depression, hopelessness, anxiety and feeling helpless (Tokala, Kandou, & Dundu, 2015). The purpose of this study was to determine whether there was a relationship between the level of depression and the quality of life of patients with chronic kidney failure reviewed from the literature. This study uses a literature review method. Data search uses three databases, namely Google Scholar and PubMed. The population in this study 3.478 journal articles. In this study, sample were found 5 literatures that were appropriate and in accordance with the inclusion and exclusion criteria and had been assessed through critical appraisal analysis using JBI.

Based on the results of the analisis of 5 journals were used samples in the literatur review in this study, it was found that there is a relationship between the level of depression and the quality of life of patients with chronic kidney failure undergoing hemodialysis. The factor that causes the level of depression to increase and worsens the quality of life of the patient during hemodialysis is the disruption of the patient's psychological factors. While the factors that can reduce the quality of life of patients with chronic kidney failure include the level of depression itself.

For Future researchers are expected to be able to conduct research on the correlation between depression level and quality of life in renal failure patients hemodialysis with more specific variables about psychological CKD patient
Keywords: Depression Level, Quality of Life of Chronic Kidney Failure Patients, Hemodialysis.

*Bibliography : 2 Websites (2019-2021)
 12 Journals (2011-2021)*