

ABSTRAK

ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN BRONKHOPNEUMONIA DENGAN INTERVENSI *CLOSED SUCTION* DI RUANG INTENSIVE CARE UNIT (ICU) DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II SARTIKA SSIH

Rizka Aulia Mawaddah¹ R. Siti Jundiah²

¹Mahasiswa Profesi Ners, Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana

²Dosen, Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana Bandung

Pasien kritis adalah pasien yang mengalami penurunan fungsi fisiologis yang cepat, mempengaruhi berbagai sistem tubuh dan berpotensi menyebabkan kematian (Romadoni, 2018). Kondisi ini memerlukan perawatan intensif di Intensive Care Unit (ICU). Salah satu penyakit yang sering ditemukan pada pasien ICU adalah bronkopneumonia. Budiono (2018). Menurut WHO (2020), bronkopneumonia merupakan penyebab kematian ke-4 tertinggi secara global, menyumbang sekitar 15% dari seluruh kematian akibat penyakit menular, dengan jumlah korban jiwa mencapai 2,6 juta per tahun. Ketidakefektifan bersihan jalan napas menjadi masalah utama yang muncul. Pasien yang dirawat di ICU, terutama yang menggunakan ventilator mekanik, memiliki risiko tinggi terkena infeksi ini karena ketidakmampuan batuk efektif dan penggunaan antibiotik yang sering tidak optimal. Salah satu prosedur yang penting dalam penatalaksanaan pasien bronkopneumonia dengan ventilator adalah teknik *closed suction system (CSS)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien Bronkhopneumonia dengan intervensi *closed suction*. Pada penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus yaitu pemberian intervensi *closed suction* di RS Sartika Asih. Setelah diberikan *Closed Suction* selama 3 hari dan hasil didapatkan bahwa dihari kedua saturasi klien meningkat menjadi 95-96 %. Dapat disimpulkan bahwa pemberian *Closed Suction* efektif sebagai penatalaksanaan non farmakologis untuk mengatasi Ketidakefektifan bersihan jalan napas.

Kata Kunci : Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif, Bronkhopneumonia, *Closed Suction*

Referensi : 3 Buku (2019-2024)
12 Jurnal (2019-2025)

ABSTRACT

ANALYSIS OF NURSING CARE FOR PATIENTS WITH BRONCHOPNEUMONIA WITH CLOSED SUCTION INTERVENTION IN THE INTENSIVE CARE UNIT (ICU) AT BHAYANGKARA TK II SARTIKA ASIH HOSPITAL

Rizka Aulia Mawaddah¹ R. Siti Jundiah²

¹nersprofessional student, Faculty of Nursing, University of Bhakti Kencana

² Lecture, Faculty of Nursing, University of Bhakti Kencana Bandung

Critical patients are patients who experience rapid decline in physiological functions, affecting various body systems and potentially causing death (Romadoni, 2018). This condition requires intensive care in the Intensive Care Unit (ICU). One of the diseases that is often found in ICU patients is bronchopneumonia. Budiono (2018). According to the WHO (2020), bronchopneumonia is the 4th highest cause of death globally, accounting for approximately 15% of all deaths from infectious diseases, with a death toll of 2.6 million per year. The ineffectiveness of airway clearance is the main problem that arises. Patients admitted to the ICU, especially those on mechanical ventilators, have a high risk of developing this infection until the inability to cough effectively and the often non-optimal use of antibiotics. One of the important procedures in the management of bronchopneumonia patients with ventilator is the closed suction system (CSS) technique. This study aims to analyze the nursing care of Mr. T with a diagnosis of bronchopneumonia and applying a closed suction intervention to reduce airway clearance. The research used is a case study of the provision of closed suction intervention in RS Sartika Asih. After being given Closed Suction for 3 days and the results obtained that on the second day the client saturation increased to 95-96 %. It can be concluded that the administration of Closed Suction is effective as a non-pharmacological treatment to address the ineffectiveness of airway clearance.

Keywords : *Ineffective Airway Clearance, Bronchopneumonia, Closed Suction*

References : 3 Books (2019-2024)
12 Journals (2019-2025)