

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kejadian resistensi TB tetap terjadi baik pada kelompok yang menerima TPT maupun yang tidak menerima TPT. Gambaran resistensi pada kedua kelompok dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, status gizi, status kawin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, faktor sosial ekonomi, perilaku seperti merokok pasif dan konsumsi alkohol, serta kondisi klinis dan hambatan dalam akses layanan kesehatan seperti keterbatasan ketersediaan obat, waktu tempuh, biaya transportasi, dan kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan turut berperan dalam kejadian resistensi. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pengendalian resistensi TB tidak cukup hanya dengan pemberian TPT, tetapi perlu pendekatan yang menyeluruh, mencakup peningkatan edukasi, pemerataan akses, serta penguatan sistem layanan kesehatan yang responsif terhadap kondisi pasien.

5.2 Saran

- Program TPT harus dilaksanakan secara menyeluruh tidak hanya berfokus pada pemberian obat, tetapi juga disertai edukasi dan pendampingan pasien guna meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan
- Penelitian lanjutan baiknya dilakukan, untuk menguji hubungan antara faktor-faktor risiko yang dianalisis dengan kejadian resistensi guna menghasilkan kebijakan berbasis bukti yang lebih tepat sasaran