

ABSTRAK

ANALISA ASUHAN KEPERAWATAN PADA STROKE HEMORAGIK DENGAN INTERVENSI *FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAINING (FAST)* TERHADAP TINGKAT KESADARAN DI RS SARTIKA ASIH

Salis Patimah¹, Haerul Imam²

Mahasiswa Profesi Ners, Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana Bandung
Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana Bandung

Pendahuluan: Stroke Hemoragik merupakan penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di sekitar atau di dalam otak, sehingga suplai darah ke jaringan otak akan tersumbat dan muncul tanda dan gejala salah satunya penurunan kesadaran. Stroke di Indonesia memiliki angka kejadian kematian yang cukup tinggi, 30% pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran GCS <8 berdampak dalam mempercepat kematian. Salah satu penatalaksanaan yang dapat dilakukan yaitu dengan terapi stimulasi *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)*. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Asuhan Keperawatan pada Stroke Hemoragik dengan Intervensi FAST terhadap tingkat kesadaran di RS Sartika Asih. Metode: Studi kasus ini dilakukan untuk mengeksplorasi masalah Asuhan Keperawatan pada Ny. R dengan cara pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil: Setelah dilakukan intervensi selama 3 hari didapatkan hasil GSC 4 E:1 V:1 M:2 (semi koma) yang mana setelah diberikan intervensi terjadi peningkatan kesadaran berupa ekstensi abnormal pada ekstremitas bawah. Stimulasi FAST yang diberikan dari suara orang terdekat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran karena FAST akan meningkatkan sistem saraf simpatis yang dapat menurunkan ketegangan dan meningkatkan ambang kesadaran. Diharapkan hasil analisis dapat diterapkan dan menjadi bahan masukan dalam bidang Keperawatan khususnya Keperawatan kritis.

Kata Kunci : Stroke Hemoragik, *Familiar Auditory Sensory Training*, GCS

Daftar Pustaka: 10 Buku (2017-2020)

19 Jurnal (2015-2025)

3 Website (2018-2024)

ABSTRACT

ANALYSIS OF NURSING CARE FOR HEMORRHAGIC STROKE WITH FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAINING (FAST) INTERVENTION ON THE LEVEL OF CONSCIOUSNESS AT SARTIKA ASIH HOSPITAL

Salis Patimah ¹, Haerul Imam²

Nursing Student, Faculty of Nursing Bhakti Kencana University Bandung

Lecturer at the Faculty of Nursing Bhakti Kencana University, Bandung

Introduction: Hemorrhagic stroke is a disease caused by the rupture of blood vessels around or within the brain, resulting in blocked blood supply to brain tissue and the emergence of signs and symptoms, one of which is decreased consciousness. Stroke in Indonesia has a relatively high mortality rate, with 30% of stroke patients experiencing decreased consciousness (GCS <8) contributing to accelerated mortality. One management approach that can be implemented is Familiar Auditory Sensory Training (FAST) therapy. Objective: This study aims to analyze nursing care for hemorrhagic stroke with FAST intervention on consciousness levels at Sartika Asih Hospital. Method: This case study was conducted to explore nursing care issues in Mrs. R through data collection via observation and interviews. Results: After a 3-day intervention, the GCS result was 4 E:1 V:1 M:2 (semi-coma), and following the intervention, there was an improvement in consciousness manifested by abnormal extension in the lower extremities. The FAST stimulation provided through the voices of close relatives influenced the improvement in consciousness, as FAST enhances the sympathetic nervous system, which can reduce tension and increase the threshold of consciousness. It is hoped that the results of this analysis can be applied and serve as input in the field of nursing, particularly critical care nursing.

Keyword : Hemorrhagic Stroke, Familiar Auditory Sensory Training, GCS

*References : 10 Books (2017-2020)
19 Journals (2015-2025)
3 Websites (2018-2024)*