

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN DIAGNOSA MEDIS
SKIZOFRENIA PADA NY.W DENGAN MASALAH KEPERAWATAN RISIKO
PERILAKU KEKERASAN MENGGUNAKAN TERAPI STRATEGI
PELAKSANAAN GENERALIS DI RUANG MERPATI
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT**

**RIZKY NURHENI SUHARJO
241FK04058**

ABSTRAK

Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Fakultas Keperawatan
Universitas Bhakti Kencana

Latar Belakang: Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa berat yang tidak hanya memengaruhi aspek kognitif dan emosional seseorang, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan sosial dan kualitas hidup penderita dengan prevalensi global 0,32% dan 3,8% di Jawa Barat. Salah satu gejala yang sering muncul adalah risiko perilaku kekerasan.. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan risiko perilaku kekerasan menggunakan terapi generalis. **Metode:** Studi kasus dilakukan pada (Ny.W) dengan risiko perilaku kekerasan di ruang merpati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Intervensi dilakukan menggunakan terapi generalis yang dilakukan selama 4 hari dalam satu minggu dan dilakukan selama dua kali sehari. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi klinis, dan evaluasi respon pasien. **Hasil:** Sebelum intervensi, pasien menunjukkan tanda risiko perilaku kekerasan seperti marah-marah, memukul orang, tangan mengepal, dan pandangan tajam. Setelah 4 hari penerapan terapi generalis, pasien mampu mengontrol emosi, tidak melakukan tindakan agresif, serta dapat mempraktikkan teknik relaksasi secara mandiri. **Diskusi:** terapi generalis efektif mengendalikan tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan dengan meningkatkan aktivitas parasimpatis dan mengurangi ketegangan fisik. Keberhasilan intervensi dipengaruhi oleh keterlibatan aktif pasien, konsistensi latihan, dan dukungan tenaga kesehatan.

Kata kunci: Risiko perilaku kekerasan, Skizofrenia, Terapi Generalis.
Referensi : 5 Buku (2012-2018)
18 jurnal (2018-2024)

**NURSING CARE ANALYSIS WITH A MEDICAL DIAGNOSIS OF SCHIZOPHRENIA IN
MRS. W WITH NURSING PROBLEMS OF RISK OF VIOLENT BEHAVIOR USING
STRATEGIC THERAPY IMPLEMENTATION GENERALIS IN THE MERPATI
ROOM WEST JAVA PROVINCIAL MENTAL HOSPITAL**

RIZKY NURHENI SUHARJO
241FK04058

ABSTRACT

*Nursing Professional Education Study Program, Faculty of Nursing Bhakti
Kencana University*

Background: Schizophrenia is a serious mental disorder that not only affects a person's cognitive and emotional aspects but also has a significant impact on the social life and quality of life of sufferers, with a global prevalence of 0.32% and 3.8‰ in West Java. One of the symptoms that often appears is the risk of violent behavior. **Objective:** This study aims to analyze the effectiveness of general therapy in managing patients with schizophrenia and nursing issues related to the risk of violent behavior. **Methods:** A case study was conducted on Ms. W, who exhibited the risk of violent behavior in the Merpati Ward of the West Java Provincial Mental Hospital. The intervention involved general therapy administered twice daily over four days per week. Data were collected through in-depth interviews, clinical observations, and patient response evaluations. **Results:** Before the intervention, the patient exhibited signs of violent behavior risk, such as anger, hitting others, clenched fists, and sharp gazes. After four days of generalist therapy, the patient was able to control emotions, refrain from aggressive actions, and independently practice relaxation techniques. **Discussion:** Generalized therapy is effective in controlling signs and symptoms of violent behavior risk by increasing parasympathetic activity and reducing physical tension. The success of the intervention is influenced by patient active involvement, consistency in practice, and healthcare support.

Keywords : General therapy, Risk of violent behavior, Schizophrenia

Reference : 5 Book (2012-2018)
18 Journal (2018-2024)