

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan empat jurnal yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian pengaturan posisi 30 derajat terhadap proses penyembuhan luka dekubitus pada pasien stroke (rentang p value 0,002-0,039). Keempat jurnal tersebut memberikan pengaturan posisi 30 derajat dengan cara yang bervariasi. Berdasarkan nilai p, pengaturan posisi 30 derajat setiap 2 jam oleh Faridah (2019) dengan alat bantu bantal yang diletakkan di punggung dan dijepitkan di kedua kaki memiliki nilai yang paling kecil (0,002) yang artinya memiliki tingkat keeratan paling tinggi bila dibandingkan dengan nilai p pada ketiga penelitian lainnya. Meskipun demikian, belum dapat disimpulkan bahwa perlakuan Faridah (2019) lebih efektif bila dibandingkan dengan perlakuan ketiga penelitian lainnya karena perlunya penelitian lebih lanjut dan pengolahan secara statistik.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Keperawatan

Hasil penelitian literatur ini dapat dijadikan Perawat sebagai bahan landasan teori dalam tindakan pencegahan terjadinya komplikasi luka tekan yang lebih memburuk pada pasien stroke.

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengambil topik pencegahan luka dekubitus pada pasien stroke dengan pemberian posisi miring 30 derajat, alangkah baiknya untuk meneliti dengan metode kuantitatif eksperimental dengan topik yang sama dan membandingkannya dengan pengaturan posisi lainya sehingga diperoleh pengaturan yang paling efektif untuk mencegah dekubitus.