

ABSTRAK

Latar Belakang: Post partum merupakan waktu ibu memulihkan alat kandungannya ke keadaan semula sebelum melahirkan sampai persalinan, masa setelah bersalin berlangsung antara 6 minggu. Post partum ibu akan mengalami perubahan secara fisiologi dan perubahan psikologi yang memerlukan proses adaptasi. Proses adaptasi jika tidak ditangani dapat menyebabkan diantaranya yaitu nyeri akut, pendarahan, depresi, menyusui tidak efektif. Tujuan studi kasus yaitu menggambarkan asuhan keperawatan pada klien post partum atas indikasi uteri hipotonik dengan masalah keperawatan menyusui tidak efektif. **Metode:** Studi kasus ini merupakan studi untuk mengeksplor dengan strategi penelitian mendalam melalui asuhan keperawatan pada klien Post Partum atas indikasi inersia uteri hipotonik dengan Menyusui Tidak Efektif di Ruang Jade Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. **Hasil:** setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan memberikan intervensi keperawatan, masalah keperawatan Menyusui Tidak efektif pada klien 1 masalah teratasi ditandai adanya pengeluaran ASI sedangkan pada klien 2 masalah Saran hasil penelitian ini dapat sebagai data dasar untuk dilakukan peneliti selanjutnya tentang menyusui tidak efektif dengan menggunakan teknik kombinasi antara pijat oksitosin dan *breast care*. belum teratasi karena belum ada pengeluaran ASI. **Diskusi:** klien dengan masalah menyusui tidak efektif tidak selalu memiliki respon yang sama pada setiap klien post partum hal ini di pengaruhi oleh kondisi atau status kesehatan klien sebelumnya. Sehingga perawat harus melakukan asuhan yang komprehensif untuk menangani masalah keperawatan pada setiap klien. Saran untuk peneliti selanjutnya tentang menyusui tidak efektif dengan menggunakan teknik kombinasi antara pijat oksitosin dan *breast care*. Saran dari hasil penelitian ini dapat menjadi data dasar bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pemberian ASI yang tidak efektif dengan menggunakan teknik kombinasi pijat oksitosin dan *breast care*.

Kata Kunci: Asuhan Keperawatan, Menyusui Tidak Efektif, Post Partum

ABSTRACT

Background: Post partum is the time when the mother restores her uterine organs to their original state before giving birth until delivery, the period after childbirth lasts between 6 weeks. Postpartum mothers will experience physiological changes and psychological changes that require a process of adaptation. The adaptation process if left untreated can cause acute pain, bleeding, depression, ineffective breastfeeding. The purpose of the case study is to describe nursing care in postpartum clients on indications of hypotonic utery with nursing problems breastfeeding is not effective. **Method:** This case study is a study to export with in-depth research strategies through nursing care in Post Partum clients on indications of hypotonic uterine inertia with Ineffective Breastfeeding in the Jade Room of Dr. Slamet Garut General Hospital. **Results:** After nursing care is carried out by providing nursing intervention, nursing problems Breastfeeding Ineffective in client 1 the problem is resolved marked by breast milk expenditure while in client 2 the problem has not been resolved because there has been no breast milk expenditure. **Discussion:** Clients with ineffective breastfeeding problems do not always have the same response to each client's postpartum condition. So that nurses must carry out comprehensive care to deal with nursing problems in each client. The suggestion of the results of this study can be as basic data for further researchers to do about ineffective breastfeeding using a combination technique of oxytocin massage and breast care.

Keywords: Ineffective Breastfeeding, Nursing Care, Post Partum