

POLA PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN DISPEPSIA DI PUSKESMAS MAJALAYA

ABSTRAK

Pola Penggunaan obat dispepsia perlu dikaji karena Langkah tepat untuk mengobati dispepsia yaitu dengan memperhatikan pola penggunaan obat dispepsia yang aman dan efektif sesuai kebutuhan klinis agar tidak terjadi reaksi tidak diinginkan dalam dosis yang memenuhi kebutuhan jangka yang cukup baik untuk masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan obat dispepsia di Puskesmas Majalaya berdasarkan jenis kelamin, umur dan jenis obat yang paling banyak digunakan karena langkah tepat untuk mengobati dispepsia yaitu dengan memperhatikan pola penggunaan obat dispepsia. Metode penelitian yang digunakan ini yaitu observasional deskriptif terhadap data retrospektif dengan cara mengumpulkan data resep periode April 2021 di Puskesmas Majalaya. Hasil dari Penelitian menunjukkan sebanyak 103 pasien dispepsia . Penggunaan obat dispepsia berdasarkan jenis kelamin pada laki-laki sebanyak (30 resep) dan pada perempuan sebanyak (73 resep). Penggunaan obat berdasarkan umur pada 5- 11 tahun sebanyak (4 resep), pada umur 12-25 tahun sebanyak (14 resep), pada umur 26-45 tahun sebanyak (18 resep), dan pada pasien umur 46-65 tahun sebanyak (67 resep). Penggunaan Obat dispepsia berdasarkan jenis obat yang digunakan Antasida sebanyak (16 resep), Ranitidin sebanyak (12 resep), Omeprazole sebanyak (49 resep), Antasida + Omeprazole sebanyak (16 resep), dan Ranitidin + Antasida sebanyak (10 resep). Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penggunaan obat berdasarkan jenis kelamin lebih banyak terjadi pada perempuan dengan persentase 70,87 %. Penggunaan obat berdasarkan umur lebih banyak pada pasien umur 46-65 tahun dengan persentase 65,04 %. Jenis obat yang paling banyak digunakan adalah Omeprazole dengan persentase 47,58 %.

Kata Kunci : Dispepsia, Resep, Pola Penggunaan Obat

PATTERN OF DRUG USE O DYSPEPSIA PATIENT IN PUSKESMAS MAJALAYA

abstract

The pattern of using dyspepsia drugs needs to be studied because the right step to treat dyspepsia is to pay attention to the safe and effective pattern of using dyspepsia drugs according to clinical needs so that unwanted reactions do not occur in doses that meet the needs for a fairly good term for the community. The purpose of this study was to determine the pattern of dyspepsia drug use at the Majalaya health Center based on sex, age and the type of drug most used because the right step to treat dyspepsia was to pay attention to the pattern of dyspepsia drug use. The research method used in this research is descriptive with a retrospective method by collecting prescription data from April 2021. Results from the study of dyspepsia drug use by sex in men (30 prescriptions), and in women (73 prescriptions). The use of drug is based on age in 4-11 years (4 prescriptions), in 12-25 years (14 prescriptions), 26-45 years (18 prescriptions), and in the 46-65 years (67 prescriptions). The use of dyspepsia drug based on the type of drug used Antacids (16 recipes), Ranitidine (12 recipes), Omeprazole (49 recipes), Antacids + Omeprazole (16 recipes), Ranitidine + Omeprazole (10 recipes). Conclusions from studies conducted using sex based drugs in women with a percentage 70,87 %. The use of drugs by age in the 46-65 years with a percentage of 65,04 %. The most widely used type drugs is Omeprazole with a percentage of 47,58 %.

Keywords : Dyspepsia; Prescription; use patterns