

ABSTRAK

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DERWATI KOTA BANDUNG TAHUN 2023

Oleh :

Denalda Salsabila

191FI04010

Diare merupakan masalah kesehatan yang masih dan dapat menimbulkan kematian di Kota Bandung terutama pada balita. Kematian kedua pada balita usia di bawah lima tahun disebabkan oleh diare. Faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita yaitu bisa karena perilaku atau lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita. Penelitian menggunakan desain *case control*. Populasi kasus dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita usia 1-5 tahun yang terkena diare, sedangkan populasi kontrol ibu yang memiliki balita 1-5 tahun yang tidak terkena diare. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposif sampling* sebanyak 78 responden. penelitian ini menggunakan Instrumen kuesioner dan observasi. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan *chi square*. Hasil penelitian menemukan bahwa riwayat ASI eksklusif ($p=0,020$) dan status gizi ($p=0,031$) berhubungan kejadian diare pada balita, sedangkan sarana air bersih ($p=0,64$), cuci tangan pakai sabun ($p=0,493$), serta penggunaan jamban sehat ($p=0,806$) tidak berhubungan kejadian diare pada balita. Menurut hasil penelitian ini disarankan masyarakat dapat mencegah faktor terjadinya diare pada balita terutama dengan meningkatkan status gizi seperti rutin datang ke posyandu, perbaikan pola asuh ibu dalam pemberian makan pada anak serta meningkatkan pentingnya ASI eksklusif pada balita seperti memberikan informasi atau penyuluhan dan pendampingan ibu sejak hamil.

Kata kunci: Diare, Status Gizi, Riwayat ASI Eksklusif, Balita

ABSTRACT

FACTORS RELATED TO THE INCIDENCE OF DIARRHEA IN TODDLERS IN THE WORKING AREA OF THE DERWATI HEALTH CENTER BANDUNG CITY IN 2023

By:

Denalda Salsabila

191FI04010

Diarrhea is a health problem that is still and can cause death in the city of Bandung, especially in toddlers. The second death in toddlers under five years of age was caused by diarrhea. Factors related to the incidence of diarrhea in toddlers can be due to behavior or the surrounding environment. This study aims to determine the factors associated with the incidence of diarrhea in toddlers. The study used a case control design. The case population in this study was mothers who had toddlers aged 1-5 years who had diarrhea, while the control population of mothers who had toddlers 1-5 years who did not get diarrhea. The sample was obtained using the purposive sampling method of 78 respondents. This study used questionnaire and observation instruments. Statistical tests were performed using chi square. The results found that history of exclusive breastfeeding ($p = 0.020$) and nutritional status ($p = 0.031$) were related to the incidence of diarrhea in toddlers, while clean water facilities ($p = 0.64$), hand washing with soap ($p = 0.493$), and the use of healthy latrines ($p = 0.806$) were not related to the incidence of diarrhea in toddlers. According to the results of this study, it is recommended that the community can prevent factors of diarrhea in toddlers, especially by improving nutritional status such as regularly coming to posyandu, improving maternal parenting in feeding children and increasing the importance of exclusive breastfeeding in toddlers such as providing information or counseling and assistance to mothers since pregnancy.

Keywords: Diarrhea, Nutritional Status, History of Exclusive Breastfeeding, Toddler