

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *DENGUE HEMORAGIC
FEVER (DHF)* DENGAN RISIKO PERDARAHAN
DI RUANG DAHLIA RSUD MAJALAYA**

SARIF HIDAYAT

211FK01015

Program Studi D III Keperawatan Fakultas Keperawatan

Universitas Bhakti Kencana

ABSTRAK

Latar belakang Kasus DHF meningkat delapan kali lipat dari 504,000 menjadi 4,2 juta. Apabila DHF tidak cepat teratasi menyebabkan penurunan trombosit, yang menyebabkan adanya resiko perdarahan. Hal ini memerlukan intervensi yang tepat. Tujuan penelitian ini bagaimanakah asuhan keperawatan pada pasien *Dengue Hemoragic Faver* dengan resiko perdarahan. **Method** : Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada 2 pasien DHF yang mengalami masalah keperawatan Resiko perdarahan. **Hasil.** Asuhan Keperawatan dilakukan selama 3 hari pada pasien 1 dan 2 Hasil evaluasi pada pasien kedua pasien didapatkan masalah teratasi dengan kriteria hasil evaluasi pada pasien 2 setelah di lakukan tindakan keperawatan berupa pemberian sari kurma jumlah trombosit pasien meningkat dari 39.00 ribu menjadi 225.000 ribu waktu 3 hari pemberian sari kurma hasil pemberian sari kurma pada pasien ke 2 lebih meningkat di banding pasien 1. intervensi yang di lakukan pada pasien 1 dan 2 di berikan sari kurma 2 botol sekitar 800 cc di minum pada pagi dan sore hari bermanfaat untuk menaikkan jumlah trombosit.

Diskusi. Pasien dengan masalah Keperawatan Resiko Pendarahan bwehubungan dengan tromboopenia tidak memiliki respon yang sama pada pasien DHF hal ini di pengaruhi oleh kondisi atau status kesehatan pasien sehingga perawat harus melakukan asuhan yang komprehensif untuk menanggapi masalah keperawatan pada setiap pasien. Sehingga sebagai perawat perlu melakukan tindakan Asuhan Keperawatan pada setiap pasien DHF dengan Resiko pendarahan yang di mulai dari pengkajian dan perumusan masalah sampai ke evaluasi, salah satu tindakan yang di berikan untuk mengatasi penurun trombositopenia adalah dengan cara pemberian sari kurma.

Kata kunci : Asuhan keperawatan, *Dengue Hemoragic Fever*, Resiko pendarahan.

**NURSING CARE FOR DENGUE FEVER (DHF) PATIENTS
WITH BLEEDING RISK IN THE DAHLIA ROOM,
MAJALAYA REGIONAL HOSPITAL**

SARIF HIDAYAT

211FK01015

D III Nursing Study Program, Faculty of Nursing

Bhakti Kencana University

ABSTRACT

Background DHF cases increased eightfold from 504,000 to 4.2 million. If DHF is not resolved quickly, it causes a decrease in platelets, which causes a risk of bleeding. This requires appropriate intervention. The aim of this research is how to provide nursing care to Dengue Hemorrhagic Fever patients with a risk of bleeding. **Method:** The research method used is descriptive with a case study approach. Case studies were conducted on 2 DHF patients who experienced nursing problems with the risk of bleeding. **Results.** Nursing care was carried out for 3 days on patients 1 and 2. The results of the evaluation on both patients showed that the problem was resolved according to the criteria of the evaluation results on patient 2 after nursing action was carried out in the form of administering date palm juice. The patient's platelet count increased from 39,00 thousand to 225,000 thousand in 3 days. giving date juice, the results of giving date juice to patient 2 were more improved compared to patient 1. The intervention carried out in patients 1 and 2 was to give 2 bottles of date juice, around 800 cc, to drink in the morning and evening, which was useful for increasing the number of platelets.

Discussion. Patients with nursing problems, bleeding risk related to thrombocytopenia, do not have the same response as DHF patients. This is influenced by the patient's condition or health status, so nurses must provide comprehensive care to handle nursing problems for each patient. So as a nurse it is necessary to carry out nursing care actions for every DHF patient with a risk of bleeding starting from assessment and problem formulation to evaluation. One of the actions given to reduce thrombocytopenia is by administering date palm juice.

Keywords: Nursing care, Dengue Hemorrhagic Fever, Risk of bleeding